

achenia interiora haud profunde sulcata, minute tuberculata, in rostrum brevius attenuata. Rostra apice infra pappo annulo piloso instructa. Pappus achenio cum rostro brevior.

Typus: Georgia. Meskhetia, ad ripam dextram fl. Kura contra p. Gobieta, in schistosis, 17 VIII 1945, D. Sosnowskyi.

Примечание: Описываемый вид близко стоит к виду *T. Ketzkhovelii*, описанному нами из Джавахетии по экземплярам, собранным Н. Н. Кецохели (Заметки по систематике и географии растений, вып. 16, 1952 г.), но отличается от последнего довольно хорошо выраженными морфологическими признаками: сильно ветвистыми, беловатыми, до верхушки густо олиственными стеблями; сизоватыми, широко-линейными листьями; мелкими корзинками, бледно-желтыми язычковыми цветками, листочками покрывала равными семянкам с хохолком или длиннее их и плоскими, белыми, по ребрам остро-бугорчато-чешуйчатыми семянками, носики которых на верхушке опушены длинными, белыми волосками.

5. *Tragopogon armeniacus* Kuthath. sp. nova

Двулетнее голое растение до 43 см высоты. Корень цилиндрический, вертикальный. Корневая шейка голая. Стебли округлые, прямые, простые или в верхней части ветвистые, на концах ветвей несущие по одной корзинке. Прикорневые листья узко-линейные, вдоль сложенные, длинные; стеблевые листья более короткие, у основания расширенные, полустеблеобъемлющие. Цветоносы под корзинками не утолщенные или при плодах слегка утолщенные, голые или покрыты очень короткими прижатыми желтоватыми волосками. Корзинки при плодах крупные. Листочков покрывала 5, ланцетных, к верхушке постепенно длинно заостренных, короче самих семян с хохолком или реже равных им. Краевые семянки с 5-ю глубокими бороздками и 5-ю выдающимися крыловидными ребрами, внезапно переходящими в короткий, почти в 1,5 раза короче их носик, вместе с носиком до 2-х см длины; внутренние семянки до 2,5 см длины, постепенно переходящие в носики и не глубоко ребристые. Носики семян толстые, на верхушке слегка утолщенные, под хохолком с кольцом из волосков. Хохолки желтовато грязно белого цвета. (Рис. 5).

Тип: Армения. Артикский р-н, в 2 км к юго-вост. от дер. Спандарчи, 1870 м н. у. м., 7 VII 1948, Асланян.

Biennis, glabra, ad 43 cm alta. Radix cylindrica, verticalis, collum glabrum. Caules teretes, erecti, simplices vel in parte inferiore ramosi. Folia radicalia longa, anguste-lineararia, complicata, caulina breviora, basi dilatata, semiam-

plexicaulia. Pedunculi^f sub calathidiis non incrassati vel statu fructifero vix incrassati, glabri vel pilis brevissimis flavescensibus^g adpressis obtecti. Calathidia magna solitaria. Involucry phylla 5, lanceolata, apice sensim acuminata, acheniis cum pappo breviora vel rarius superantia. Achenia marginalia cum rostro ad 2 cm lg., profunde 5-sulcata et 5-alato-costata, apice in rostrum achenio 1 $\frac{1}{2}$ -plo brevius abrupte contracta, cum rostro ad 2 cm longa; achenia interiora ad 2 $\frac{1}{2}$ cm lg., haud profunde sulcata, in rostrum sensim attenuata; rostra crassa, apice vix incrassata, infra pappo annulo piloso instructa. Pappus sordido-albus.

Typus: Distr. Artik, 2 km a p. Spandarczi versus austro-orientem, 1870 m supra mare, 7 VII 1948, Aslanian.

Примечание: Описываемое растение близко стоит к *T. coloratus* С. А. М., но и отличается от последнего целым рядом морфологических признаков. Более узкими, вдоль сложенными листьями, цветоносами под корзинками слегка утолщенными, краевыми семянками с пятью глубокими бороздками внезапно суженными в носик и грязно-желтоватыми хохолками, в то время как у *T. coloratus* листья ланцетно-линейные у основания расширенные, цветоносы под корзинками сильно утолщенные; краевые и внутренние семянки почти одинаковые, не глубоко ребристые постепенно оттянуты в носик; хохолок окрашен в грязно-фиолетовый цвет.

Последний вид широко распространен в нижнем и среднем горном поясах Малого Кавказа, а выделенный нами вид произрастает в субальпийском поясе и известен пока, из одного пункта северо-восточной части Армении.

6. *Tragopogon Tasch-Kala Kuthath. sp. nova*

Двулетнее хлопьевидно-опушенное растение, до 47 см. высоты. Корень вертикальный, цилиндрический. Корневая шейка голая. Стебли округлые, беловатые, от основания или чаще от середины ветвистые, густо олиственные, на концах веточек несущие по одной корзинке, с короткими междоузлиями. Прикорневые листья линейные; стеблевые листья укороченные, у основания расширенные, ланцетные, к верхушке постепенно длинно заостренные, полустеблеобъемлющие многочисленные и густо расположенные. Цветоносы при плодах слегка утолщенные, полые. Корзинки крупные, в особенности при плодах. Цветки желтые, длиннее листочков покрывала. Листочков покрывала 12, ланцетных, по краям отвороченных, короче семянок с хохолком. Краевые семянки с 5-ю глубокими ребрами, на спинке крыловидные, внезапно суженные в носик короче семянки. Носики на верхушке слегка утолщенные, под хохолком с кольцом из волосков. Хохолки грязно-белого цвета. (Рис. 6).



Рис. 5. *Tragopogon armeniacus* Kuthatheladze
1. Краевая семянка с легучкой