

rostro achenii longiore et tenuiore laevissimo, nunquam gibberuloso, calathidiis paucioribus differt. Planta polymorpha. Foliorum latitudo et pubescentia totae plantae valde variant.

**10. Generis *Tragopogon* L. series *Floccosi* Klok. nova.**

Calathidia numerosa, inflorescentiam communem paniculato-corymbosam formantia. Pedunculi sub calathidio haud incrassati; involucrium vulgo octophyllum, raro 7- vel 9-phyllum, flosculi flavi, marginales involucrio praestantes. Antherarum tubulus flavus. Achenia rostro brevi vel nullo. Herbae biennes dense pubescentes.

*T y p u s*: *Tragopogon floccosus* W. K.

Ad seriem hanc species psammophilae europaeae in arenis a littoribus balticis usque ad caspica dispersae pertinent.

**11. *Tragopogon Artemczukii* Klok. species nova. — Series *Floccosi* Klok.**

Caules solitarii vel bini, erecti, 17—20 *cm* alti, ramosi, foliiscum plus minusve arachnoidei, in parte inferiore et sub calathidiis albido-tomentosi. Folia radicalia necnon caulina inferiora anguste linearia, usque ad 15 *cm* longa, 1—2 *mm* lata, inferne sat dense flocculoso-arachnoidea, superne glabrata; folia superiora e basi ovata vel oblongo-ovata in apicem anguste linearem attenuata, ca. 1—2 *cm* longa, 2—4 *mm* (basi) lata, in parte dilatata flocculoso-arachnoidea, apice contorta. Calathidia 7—12 (et ultra); involucrium subcylindricum, 15—27 *mm* longum, 2—5 *mm* diametro, basi densiuscule, supra parciuscule arachnoideum; involucri phylla 6—8, lineari-lanceolata, 1,2—2,8 *mm* lata, acuminata; flosculi pallide flavi, marginales involucrio praestantes, ligulae eorum 13—17 *mm* longae, 2,5—3 *mm* latae, denticulis brevissimis; antherarum tubulus flavus. Achenia 15—17 *mm* cum rostro longa, 0,9—1,2 *mm* diametro, apice subabrupte in rostrum ca. 5—6 *mm* longum, achenio ipso subduplo brevius attenuata; pappus 14—17 *mm* longus, laete fumanus; achenia marginalia obtuse pentagona, superne in costis et basi rostri squamulis acutiusculis obsita.

Floret VI—VII. Habitat in pratis arenosis borysthenicis.

*T y p u s*. RSS Ucr., ditio Kioviensis, districtus Beresaniensis, in prato prope pag. Bakumivka, 23. VII 1930, G. Czornogolovko. Kioviae conservatur.

*A f f i n i t a s*. A proximo *T. ucrainico* *Artemcz.* involucrio longiore et angustiore, rostro achenii longiore et squamuloso, haud laevi, statura humili differt et notis multis ad *T. bjelorusicus* *Artemcz.* septentrionalem appropinquat.

**12. *Tragopogon dolichocarpus* Klok. species nova. — Series *Floccosa* Klok.**

Caules 45—50 *cm* ca. alti, foliiscum dense flocculoso-arachnoidei, ramosi. Folia radicalia necnon caulina inferiora linearia, usque ad 20 *cm* longa, 3—4 *mm* lata; folia apicalia ovata vel ovato-lanceolata, 7—15 *mm* longa, 5—10 *mm* lata, attenuato-acuminata, apice brevi deflexo. Calathidia sat numerosa, involucrium 15—32 *mm* longum, 5—10 *mm* basi diametro;