

incurvis, capitulo majusculo, involucri basi tomentelli phyllis 8 flosculis luteis concoloribus brevioribus, acheniis brevibus striatis crebre squameloso-muricatis in rostrum eis triplo brevius sensim attenuatis γ .

Hab. in pascuis siccis regionis alpinæ Anatoliæ, Olympus Bithynus (Auch. 3333! Boiss!), montes Davros Pisidiæ et Anemas Lycaoniæ 6000' (Heldr!). Specimina Persica in Diagn. dubitanter citata huc non spectant.

Planta 3-4-rarius 6-7-pollicaris, radix tenuis longa nuda cujus terminationem non novi, folia radicalia 2-3-pollicaria 2 lineas lata, caulina caule multo breviora, achenia 6-7 lineas longa.

24. **T. aureum**, parce floccosum tandem glabrum viride, radice tenuissime cylindricâ nudâ ramosâ, collo tenui vaginato-fibroso, caule pumilo simplicissimo ad medium folioso, foliis brevibus 7-9-nerviis acutis inferioribus lanceolatis basi longe attenuatis, superioribus amplexicaulibus oblongo-ellipticis acutis, capitulo magno, involucri phyllis 8-9 abbreviatis margine puberulis, flosculis marginalibus latis intense aureis involucrio duplo longioribus, acheniis... γ .

Hab. in collibus Ponti Lazici ad orientem montis Tcharantach sitis (Bal!). Fl. fine Julii.

Semipedale vel paulo procerius, folia 4-5 lineas lata, infima pollicaria sæpe obovata, sequentia cum petiolo 2-4 pollicaria, summa 12-15 lineas longa 5-6 lata, capitulum pulchre aureum illo *T. Orientalis* majus. Radice tenui sed certe perenni et foliis brevibus insigne.

25. **T. filifolium** (Rehmann Mss.) ad vaginas inferiores et folia radicalia lanatulo-ciliatum cæterum glabrum, radice tenui verticali, caulibus ex collo fibroso 2-3 ascendentibus pumilis monocephalis parte dimidiâ inferiore foliatis, foliis anguste filiformibus flexuosis, caulinis in vaginam dilatatis, capitulis parvis, involucri phyllis 8-10 angustis acuminatis basi tomento deterrenti brevi obsitis externis 1-2 subbrevioribus, ligulis flavis involucrium quartâ parte superantibus, acheniis parvis angulatis ad angulos muricatis apice sensim brevissime et indistincte rostratis γ .

Hab. in fissuris rupium colli Darial Caucasi (Rehmann!).

Folia radicalia 2-3 pollices longa dimidiam lineam vix lata, caulinarum vagina sesquilineam lata, caules 8-10-pollicares, achenia 5 lineas longa, pappi achenio triplo brevioris setæ nonnullæ longiores apice scabræ. Species foliis angustissimis, acheniis breviter et obsolete rostratis insignis.

26. **T. erostre** (Boiss. et Haussk.) glabrum glaucescens, rhizomate suffrutescenti ramoso pluricipiti cespitoso-multicauli, caulibus tenuibus elongatis inferne crebre foliosis simplicibus vel parte inferiori parce ramosis, foliis anguste linearibus trinerviis flexuosis, superioribus valde abbreviatis basi non dilatatis, pedunculis longis gracilibus non incrassatis, capitulis parvulis paucifloris, involucri phyllis quinque flosculis aureis tertiâ parte brevioribus, acheniis brevissimis