

Flor. maio, in horto april. ♀.—Flores flavi: ligulæ exteriores subtus violaceæ; involucrum caliculatum foliolis discoloribus valdè insigne, exterioribus sub triplò brevioribus subalbidis vel rubescensibus, interioribus omnino virentibus: caulis humilis fructiferus vix 10 cent. altus, vel in plantâ cultâ luxuriantे fructiferâ 20 cent. metiens.

A *T. obovato* DC., *palustri* DC., *dente-leonis* Desf. et aliis affinibus facillimè dignoscitur: involucri foliolis discoloribus orniculatis exterioribus brevibus subincurvatis erectis, akeniis albissimis, foliis brevibus humo adpressis et caule ascendentе vel declinato. Species ex seminibus in horto per plures annos culta constantissima, et ab omnibus distinctissima.

(40) **TRAGOPOGON AUSTRALIS.** Jord. — *T. porrifolius* auct. gallorum non L. — Pedunculis apice incrassatis, involucri foliolis 8-12 lanceolatis acuminatis glabris sub anthesi *refractis* corollâ atro-violacea plâno-convexâ multò longioribus, akeniis exterioribus griseis costatis à basi exquisitè sursùm tuberculato-scabris, tuberculis laxis subrotundo-obovatis, pappi rufescentis stipite albido apice ferè glabro *akenio paulò longiore* pappo autem breviore, foliis radicalibus erectis *haud strictis* linearì-acuminatis undulatis, caulinis basi dilatata amplexicaulibus sèpè apice subtortilibus glabris vel ad axillas aratooso-hirsutis, caule erecto sèpè ramoso glabro, radice bienni vel sèpè annua.

Hab. in collibus herbosis, ad vias et margines agrorum in Galliâ australi, haud infrequens; Hyères! Toulon! Marseille! etc.—Flor. maio. ♂ vel ♂.—Flosculi parum numerosi: ligulæ oblongæ truncatæ apice 5 dentibus lanceolatis acutis terminatæ: tubus antheriferus violaceo-nigrescens ad angulos lutescens stylis duplò longior: akenia subæqualiter 10 angulato-costata minutè laxèque muricata, centralia ferè levia: caulis 3-5 dec. altus.

Obs. *T. porrifolius* L. in hortis ad usum culinarium sèpissimè cultus à plantâ gallicâ *toto cœlo* dissert: capituli sunt duplò majores, sub anthesi planissimi, nunquam ob involucrum refractum convexi: flosculi numerosiores amoenè lilacino-purpurei, involucri foliola subæquantes: akenia fulva nec grisea, multò latiora, valdè obliquæ subarcuata minùs apice attenuata et magis abruptè in pappi stipitem conspicuè breviorem abeuntia; pappus brevior fulvus: folia latiora, stricta haud undulata nunquam tortilia: caulis robustior, elatior: radix verè biennis nunquam primo anno caules floriferos edit.

