

fine T. pratensi. Cor. flavæ, numerosiores quam hujus, sed exter. non radiantes.

12. T. CAMPESTRE (Bess. enum. vol. n. 1626), glabrum, foliis linearibus, radicibus vix basi lato-ribus, caulinis basi late vaginato-dilatatis, pedunculo vix subin-crassato, invol. 8-phyllo flosculos superante, achæniis . . . — in campis Bessarabie et Podoliae australis (Bess.), in Tauriâ (Godet!). Cor. ex Spreng. syst. 3. p. 663 flavæ, ex specim. Godetiano sicco pallidæ et purpurascentes. An nostra certè eadem ac Besseriana? An eadem ac T. pratense ? (v. s. comm. à cl. Godet.)

13. T. FLOCCOSUM (W. et Kit. pl. rar. hung. 2. t. 112), floccoso-lanatum, caule erecto ramoso, foliis linearis-subulatis canaliculatis integerrimis, pedunculis teretibus, invol. 8-phyllo ligulis exterioribus breviore, achæniis sulcatis elongatis vix in rostrum attenuatis, costis supernè serrulatis. (2) in arenosis sub-sylvaticis Hungarie circè Pesth, etc. (Kit.), circè Astrachan (Trev.), in summo Libano? (Auch! n. 3340), ad Tergestum (Reichenb.), ad margines agrorum distr. Khoi prov. Aderbeischan (Fisch. et Mey.), demùm in Borussiâ boreali si T. heterospermum Scheig. in Koen. arch. nat. 1812. p. 229. hue ritè (etiamsi diffusum) relatum. T. canus Willd. sp. 3. p. 1493. Habitus T. undulati et T. pratensis. Cor. flavæ. (v. s.)

14. T. GRAMINIFOLIUM, glabrum aut rariùs hinc inde floccosum, caulinis è collo plurimis simplicibus sub capitulo teretibus tomentosis, foliis lanceolato-linearibus integerrimis acuminatis, invol. 8-phyllo corollis subbreviore, achæniis apice spinellosso-muricatis rostri longitudinem æquantibus. — in Imeretiâ legit cl. Szowitz. T. Caucasicum Fisch. et Mey.! non Bess. Cor. flavæ aut ex sicco in iisdem indiv. subpurpurascentes. Achænia basi læviuscula 4-striata. (v. s. comm. à cl. Fisch. et Mey.!)

15. T. BREVIROSTRE, glabrum, foliis lanceolato-linearibus acuminatis integerrimis, caulinis ramosis, ramis 1-cephalis apice teretibus nudis glabris, invol. circ. 8-phyllo floribus subæquali, achænio à basi spinellosso-muricato rostri longitudinem superante. — ad Caucasum. T. Caucasicum Bess.! in litt. non Szow. Cor. ex sicco vid. purpurascentes? (v. s.)

β. intermedium, pedunculis sub capitulo tomentosis, corollis flavis. — in deserto Caucasio-caspico legit cl. Godet. T. intermedius Bess. enum. vol. p. 83? ex Godet. (v. s.)

γ. Podolicum, caule ramoso, pedunculis glabris, foliis lato-ribus, rostro breviori — in pratis Podoliae austr. et gub. Chersonensis. Tr. Podolicus Bess.! in litt. 1831. (v. s.)

δ? Lithuanicum, caule humili basi foliisque lanuginosis, pedunculo glabro, achæniis sublævibus. — in sabaletis Lithuaniae. Tr. Lithuanicum Bess.! in litt. 1831. Cor. flavæ. An sp. propria, suad. cl. Bess.? (v. s.)

16. T. CROCEROLIUM (Linn. sp. 1110), glabrum, foliis angustè linearibus strictis, pedunculis teretibus, invol. 5-6-phyllo ligulas paulò superantes, rostro ad originem pappi glaberrimo. (2) in pratis apri-cis montosis Europæ australioris et Orientis. DC. fl. fr. n. 2992. — Col. ephr. t. 230. Flores violacei. Achænia muricato-scaberrima, rostro lævi apice etiam glabro. (v. v. et s.)

β. flocculosum, foliis supernè præsertim ad axillas floccoso-tomentosis. — cum var. α. (v. v. et s.)

17. T. MUTABILE (Jacq. ic. rar. 1. t. 157. misc. 2. p. 316), glabrum aut ad axillas et basin involuci vix lanatum, foliis semiamplexicaulibus lanceolato-linearibus integris strictis acuminatis, pedunculis teretibus, invol. 8-phyllo corollas radii circ. æquante. (2) circè Astrachan (Bieb. Stev.). Cor. nunc pallidè albentes, nunc flavidæ aut rosæ lineis rubris striatae. Achæn. indeser. (v. s.)

18. T. RUBRUM (S. G. Gmel. itin. 2. p. 198), junius arachnoideo-lanatum, caule erecto folioso, foliis lanceolato-linearibus subundulatis cauleque glancis, pedunculis teretibus, invol. suboctophyllo corollis radii dimidiò breviore. (2) in campestribus deserti Soongoro-Khingisisi (Ledeb.), in hortis circè Astrachan