

- fine *T. pratensis*. Cor. flavæ, numerosiores quàm hujus, sed exter. non radiantes.
12. *T. CAMPESTRE* (Bess. *ennois*, vol. 11. 1836), glabrum, foliis linearibus, radicalibus vix basi latioribus, caulinis basi latè vaginato-dilatatis, pedunculo vix subincrassato, invol. 8-phylo flosculos superante, acheniis, . . . — in campis Besurabim et Podolic australis (Bess.), in Tauriâ (Godet!). Cor. ex Spreng. syst. 3. p. 663 flavæ, ex specim. Godetiano sicco pallide et purpurascens. An nostra certè eadem ac Bessiana? An eadem ac *T. pratense* ?? (v. s. comm. à cl. Godet.)
13. *T. FLOCCOSUM* (W. et Kit. pl. rar. hung. 2. t. 112), floccoso-lanatum, caule erecto ramoso, foliis lineari-subulatis canaliculis integerrimis, pedunculis teretibus, invol. 8-phylo ligulis exterioribus brevioribus, acheniis sulcatis elongatis vix in rostrum attenuatis, costis supernè serrulatis. (2) in arenosis sub-sylvaticis Hungariæ circà Pesth, etc. (Kit.), circà Astrachan (Trev.), in summo Libano? (Auch. n. 3340), ad Tergestum (Reichenb.), ad margines agrorum distr. Khoi prov. Aderbeischean (Fisch. et Mey.), demùm in Borussia boreali si *T. heterospermum* Schleg. in Koen. arch. nat. 1812. p. 229. huc ritò (etiãsi diffusum) relatum. *T. canis* Willd. sp. 3. p. 1493. Habitus *T. undulati* et *T. pratensis*. Cor. flavæ. (v. s.)
14. *T. GRAMINIFOLIUM*, glabrum aut rarius hinc inde floccosum, caulibus è collo pinnicinis simplicibus sub capitulo teretibus tomentosis, foliis lanceolato-linearibus integerrimis acuminatis, invol. 8-phylo corollis subbreviore, acheniis apice spinuloso-muricatis rostri longitudinem æquantibus. — in Imeretiâ legit cl. Szowitz. *T. Caucasicum* Fisch. et Mey. non Bess. Cor. flavæ aut ex sicco in iisdem indiv. subpurpurascens. Achenia basi leviuscula 4-striata. (v. s. comm. à cl. Fisch. et Mey.)
15. *T. BREVINOSE*, glabrum, foliis lanceolato-linearibus acuminatis integerrimis, caulibus ramosis, ramis 1-cephalis apice teretibus nudis glabris, invol. circ. 8-phylo floribus subæquali, achenio à basi spinuloso-muricato rostri longitudinem superante. — ad Caucasum. *T. Caucasicum* Bess. in litt. non Szow. Cor. ex sicco vid. purpurascens? (v. s.)
- β. *intermediam*, pedunculis sub capitulo tomentosis, corollis flavis. — in deserto Caucasico-caspico legit cl. Godet. *T. intermedius* Bess. *ennois*, vol. 1. p. 83? ex Godet. (v. s.)
- γ. *Podolicum*, caule ramoso, pedunculis glabris, foliis latioribus, rostro breviori — in pratis Podolic austr. et gab. Chersonensis. Tr. *Podolicum* Bess. in litt. 1831. (v. s.)
- ?? *Lithanicum*, caule humili basi folisque lanuginosis, pedunculo glabro, acheniis volvilibus. — in sabuletis Lithaniæ. Tr. *Lithanicum* Bess. in litt. 1831. Cor. flavæ. An sp. propria, suad. cl. Bess.? (v. s.)
16. *T. CROCIFORME* (Linn. sp. 1110), glabrum, foliis angustè linearibus strictis, pedunculis teretibus, invol. 5-6-phylo ligulas paulò superantes, rostro ad originem pappi glaberrimo. (2) in pratis apricis montosis Europæ australioris et Orientis. DC. fl. fr. n. 2992. — Col. cephr. t. 230. Flores violacei. Achenia muricato-saberrima, rostro lævi apice etiã glabro. (v. v. et s.)
- β. *flocculosum*, foliis supernè præsertim ad axillas floccoso-tomentosis. — cum var. α. (v. v. et s.)
17. *T. NOTABILE* (Jacq. loc. rar. 1. t. 157. misc. 2. p. 316), glabrum aut ad axillas et basin involucri vix lanatum, foliis semiamplexicaulibus lanceolato-linearibus integris strictis acuminatis, pedunculis teretibus, invol. 8-phylo corollas radii circ. æquante. (2) circà Astrachan (Dieb. Stev.). Cor. nunc pallidè albentes, nunc flavide aut rosæ lineis rubris striata. Achen. indescr. (v. s.)
18. *T. RUDAX* (S. G. Gmel. itin. 2. p. 198), junius arachnoideo-lanatum, caule erecto folioso, foliis lanceolato-linearibus subundulatis cauleque glandis, pedunculis teretibus, invol. suboctophyllo corollis radii dimidiò brevioribus. (2) in campestribus deserti Ssongoro Kîrghisici (Ledeb.), in hortis circà Astrachan