

Cal. erectus, Petalorum laminae obovatae regulares. Siliqua 4 gonoteres, valvulis concavis carinatis septo membranaceo aequalibus. Stylus brevis teres. Stigmatis lobi patuli. Funiculi alati. (In *Hesperide compressi*, non alati) *Andrz.* Ut differentia a *Hesperidibus* inagis pateat et huius subiungo characterem, quibus.

Cal. erectus, Petala linearia contorta. Siliqua anceps, valvulis planis carinatis, septo fungoso angustioribus. Stylus brevis anceps. Stigmatis lobi adpresse conniventes. *Andrz.*

p. 27. 71. n. 843. *H. matronalis.*

Non est *H. matronalis* L, quae omnium glaberrima, foliis petiolatis, pedunculis glabris, calycem glabrum vix superantibus. Pili semper simplices, rari, sparsi, nec est *H. runcinata* W. et K. uti contendit *cel. Candoll. l.c.* cui folia subcanescentia, radicalia sublytatoruncinata, pubes densa, simplex, bifurca, nec non ramosa, flores pallide violacei, semper inodori, et pedunculi calyce carina villosa triplo longiores hirsuti: sed est mihi *D. suaveolens*, foliis viridibus inaequaliter argute dentatis, inferioribus obovato-oblongis petiolatis, superioribus lanceolatis acuminatis, subcordatis sessilibus, pedunculis glabris, calyce apice barbato duplo longioribus; pube simplici glandulosa *Andrz.*

Flores purpurei speciosi, dinque noctuque odorati. Pubes totius plantae sunt pili simplices, apice glandulosi. Calycum villi longi glandulosi. Rachis et pedunculi glabri. Idem.

Ibidem n. 1554 *ERYSIMUM exaltatum* corrige in definitione et descriptione: glandulis externis trilobis, lobis subaequalibus.

p. 72. Col. 1. lin. 14 loco "*E. strictum*," lege "*E. strictum*,"

Ibidem n. 1556. *CHEIRANTHUS versicolor* non est *CHEIRANTHUS* species, ob cotyledones, radiculae incumbentes. Siliquae anguli obtusi. Est mihi *ERYSIMUM.* *Andrz.*

Ibidem col. 2. lin. 12. loco "*superante*," lege "*siliquae adaequantae*," *Andrz.*

1621. *BARBAREA arcuata* Presl. *Flora Cechica 1819. p. 138. sub* *ERYSIMO B. taurica* DC. l. c. p. 207.

In Volhyniae et Podoliae umbrosis.

DXI. GÜNTHERA *Andrz.*

Cal. erectus. Petala unguiculata, limbo patente. Siliqua stipitata, teres, valvulis carinatis, stylo conico basi submonospermo rostrata. Semina ovoideo-globosa, funiculis filiformibus, liberis placentae (non septo) adfixa, uniserialia *Andrz.*

Genus dictum in honorem *cl. Güntheri* Pharmacopoei Wratislaviensis, Florae Silesiacae cultoris eximii atque centuriarum plantarum Silesiae exsicatorum cum *cl. Schumelio* Editoris.

p. 28. n. 850. *G. elongata* W. et K. (BRASSICA).

ERUCA Tournef. (BRASSICA L.)

1622. *sativa* DC. l. c. p. 637. In arvis interque segetes *Andrz.*

DXII. RHAMPHOSPERMUM *Andrz.* (SINAPIS L. DC.)

Cal. patens; petala erecta, limbo patente. Siliqua sessilis angulata, stylo compresso-conico nervoso, basi monospermo, sponte secedente rostrata. Semina subglobosa, funiculis compressis septo adnatis adfixa uniserialia *Andrz.*

Nomen a rostro s. stylo seminfero desumptum: huc p. 28. n. 851. *SINAPIS arvensis* et 1623 *R. orientale*, quod sparsim cum priori occurrit.

DXIII. CAKILE *Gaertn.*

1624. *C. Serapionis* *Gaertn. T. II. p. 287. t. 141. f. 12. C. maritima* W. *Sp. pl. T. III. P. I. p. 416.*

Ad Pontum, Euxinum Odessae *Andrz.*

p. 73. Col. 1. lin. 3. ab infra loco "*P. amara*," lege "*amara*,"

1625. *TRAGOPOGON intermedius* mihi in *Enum. sem. horti. bot. Lyc. Volh. Cremen. a. MDCCCXXI.*
Affinis *T. maiori*, at flosculis lu-

- teis et anthodio 8 phyllo praecipue differt. E Podolia Australi Andr.
1626. *T. campestris* mihi l. c. affinis *T. maiori* et *livessenti*; a priori anthodio 8 phyllo, a posteriori flosculis anthodio brevioribus aliisque differt.
- In Campis Bessarabiae legi 1816. serius e Podolia australi attulit semina *Andrzejowscius*.
1627. *CENTAUREA paniculata* L. In Podolia Australi Andr.
1628. *C. calocéphala* W. E seminibus e Podolia australi alatis modo in horto colitur Andr. p. 35. n. 1144. *C. neglectam* Ill. *Steven* habet pro *C. orientalis* varietate, quorsum ducit et *C. tataricam* nostram cl. L. B.
- Marschall a Bieberstein* misit mihi *C. neglectam* nomine *C. tataricae*. Quis hic lites componet? Polymorphia caeterum harum plantarum negari non potest.
1629. *EPIPACTIS atrorubens*, quam varietatem *latifoliae* esse putavi.
- DXIV. LIMODORUM L.
- 1630 *Epipogium* L. (SATYRIUM), In sylvā Zawadyńce Distr. Kamenec. Andr.
1631. *LYCOPODIUM Selago* L. In frutetis Cremeneci Hortul. *Witzell*.
- DXV. STRUTHIOPTERIS W.
1632. *germanica* W. In nemorosis circa Kiew. cl. L. B. *Marschall Bieberstein*.
- Cremenecii 1. Martii 1822.