

4. TRAGOPOGON *orientalis*.

T. calycibus corollae radio brevioribus, foliis integris subundulatis. *Hort. upf.* 243.

Tragopogon orientale angustifolium, flore maximo luteo. *Tournef. cor.* 36.

Barba hirci. *Cam. epit.* 312. figura.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syst. 9. p. 4.

Orientalischer Bocksbart. W.

Habitat in Oriente, Astracan. *Gmel. it.* 2. p. 198.

♂ (v. f.)

Differit a *T. pratensi* Flore majore, Calyce ubi reflectitur quasi fracto; Radio Corollae subtus luteo, nec fuscō siriato; Antheris luteis, nec fuscis.

*5. TRAGOPOGON *canus*.

T. calycibus octophyllis radium corollae subaequantibus, pedunculisque tomentosis, foliis linearibus strictis. W.

Tragopogon canus. *Waldst. et Kitaibl. pl. rar. hung.*

Filziger Bocksbart. W.

Habitat in pratis Hungariae. ♂ (v. f.)

Caulis valde ramosus divaricatus. Folia linearia nervosa non undulata. Calyces, Pedunculi et Ramii juniores tomento albo tecti. Calyces octophyli longitudine corollae vel parum breviores. Corollae pallide luteae. W.

*6. TRAGOPOGON *major*.

T. calycibus corollae radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis, corollulis ad apicem rotundatis. *Murr. syst. veg. ed.* 14. p. 710. *Jacq. aust.* I. t. 29. *Hoffm. germ.* 272. *Roth. germ.* I. 332. II. 239.

Grosser Bocksbart. W.

Habitat in pratis, vineis Germaniae, Austriae. ♂ (v. v.)
Corollae flavae. W.

7. TRAGOPOGON *porrifolius*.

T. calycibus corollae planissimae radio longioribus, corollulis angustissimis truncatis, pedunculis superne incrassatis, caule stricto. *Jacq. ic. rar.* I. t. 139. *Collect. I.* p. 99.* *Hoffm. germ.* 272.