

62. *Sesleria argentea*, Savi (*S. cylindrica* DC), au pied des rochers à côté du chemin de fer, au nord d'Alar.

64. *Sideritis hirsuta*, L. α *vulgaris*. Champs pierreux, autour d'Alar.

65. *Silene hirsuta*, Lagasca. Moissons, au nord d'Alar.

65. *Silene legionensis*, Lagasca. Endroits pierreux; collines à côté du chemin de fer; commun.

66. *Sisymbrium hirsutum*, Lagasca. Autour des habitations; décombres, etc., près de la gare.

67. *Spiræa rhodoclada*, sp. nov. (Ex affinitate *Spirææ hypericifoliæ* et *flabellatæ* Bert.) Frutex 2-3 pedalis, trunco ramisque vetustioribus sparse pilosis, fusco-cinereo corticatis, junioribus pulchre rubentibus, foliis (exstipulatis) parvis (1 1/2 centimetr. longis) coriaceis, glabris, subtus reticulato-venosis, lanceolato-obovatis, integerrimis, margine cartilagineo sub revoluto, majoribus ramorum sterilium fere rhombeis acutis, nervis rubro-pellucidis, floribus numerosis pedunculatis, in umbellas simplices, plerumque 5 floras, ramulos laterales brevissimos 3-5 foliatis terminantes et inflorescentiam spicatam, 6-14 centimetra longam formantes dispositis; petalis rotundatis parvis, staminibus corolla brevioribus, folliculis carinatis, stylo fere æquilongo, purpureo, horizontaliter refracto terminatis. Dentes calycini triangulares, virides, anguste et pallide cartilagineo-marginati, acuti, sinus (inter dentes) rotundatis, sæpe callo rubescente notatis. — Hab. in colle saxoso ad septentrionem pagi Alar del Rey (Cast. Vet.) Hispaniæ borealis, sociis *Lavandula pedunculata*, *Arctostaphylo uva-ursi*, etc. Flor. Jun. fruct. Jul.

68. *Thapsia villosa*, L. (non recueilli), extrêmement abondante dans les champs abandonnés au midi d'Alar.

69. *Thesium divaricatum*, A. DC. Champs secs, au nord d'Alar.

70. *Thymus Mastichina*, L. Abonde sur les collines et côtés des routes autour d'Alar.

71. *Thymus Serpyllum*, L., β *angustifolius* Rehbch. fil. Endroits pierreux, au nord d'Alar.

72. *Thymus zygis*, L. Collines, bords des routes, au nord d'Alar. Très commun, en touffes compactes, extrêmement floribondes.

73. *Tragopogon castellanum*, Levier. sp. nov: Stirps a collo radicis ad capitula 24 - 27 centimetra alta (in exemplare unico),

indumento floccoso-cano subpersistente, præcipue ad vaginas foliorum caulesque juniores *obsita*, radice verticali, *collo leviter napiformi-incrassato*, albo-squamato aut muriculato, caule a basi in 5 — 6 ramos foliosos, adscendentes, stricte-erectos, anthodium unicum gerentes diviso, foliis anguste linearibus canaliculatis, *nervis 3 crassis percursis*, flexuosis, glabris (excepta vagina extus niveo et longe floccosa), inferioribus ad 12 - 14 centimetra longis, 2 millimetra latis, caulinis basi dilatatis semi amplexicaulibus, longe vaginantibus, superioribus brevioribus, angustioribus, *ramis fructiferis striatis sub anthodio valde* (et fistuloso) *incrassatis involucro octophyllo flosculis luteis* (ex inspectione flosculorum vetustiorum, siccitate corrugatorum) $\frac{1}{4}$ breviores phyllis e lata basi longe et acute lanceolatis attenuatis (in fructu 3 - 3 $\frac{1}{2}$ centimetr. longis), exterioribus tote viridibus, interioribus basi scarioso-marginatis, basi et extus sparse arachnoideis, *acheniiis* longiusculis (2 cent. longis) pallide fuscis, *in rostrum leve, striatum, albescens stramineum* (couleur de paille) *apice incrassatum et sub pappo longe lanato penicillatum*, ACHENIO DUPLO BREVIUS sensim attenuatis marginalibus basi arcuatis striatis *crebre et eburneo muricatis squamulosis*, centralibus rectis minus crebre muricatis, intimis basi inermibus, pappo 2 $\frac{1}{2}$ centimetra longo, radiis stramineis, lana plumosa sordida. (2) aut (1) ? Flor. Jun. Jul.

Hab. in incultis herbosis et agris siccis ad pagum Alar del Rey (prov. Palencia) Castellæ veteris.

Tragopogon floccosum W. et Kit. longe differt *caule* elato *ramoso*, anthodiis, acheniisque multo minoribus, rostro brevissimo, etc. — Nulla cum aliis speciebus generis europæis affinitas. — Species distinctissima.

74. *Trisetum ovatum* (P. B. et R. S. sub Trichetta), *Bromus ovatus* Cav. Champs au nord d'Alar.

75. *Vicia onobrychioides*. L. Champs au nord d'Alar.

A Alar del Rey et de là en avançant vers le nord, les collines deviennent plus fréquentes. De jolies plantes, que nous n'avons pas le temps de reconnaître, ornent les parois des rochers.