

- (Trev.) Ledeb. fl. alt. 4. p. 158. ic. fl. ross. ill. i. t. 30. T. roseus Trev. mag. naturf. ges. Berl. 1816. p. 152. Cor. roseæ seu dilutè purpurascens.
19. T. COLLINUM, lanâ floccoso-arachnoideâ hinc indè onustum, foliis lanceolato-linearibus plerisque undulato-crispis, caule 1-cephalo foliorum longitudine subnudo apice non incrassato, invol. 8-phylo corollas radii æquante, — in collibus Cancasi circâ Baku (C. A. Mey.!) et in collibus siccis lapidosis circâ Ormiah prov. Aderbeischan (Szow.!). T. roseus Mey.! enum. n. 489. non invol. corollas æquante nec dimidiò breviorè, à T. mutabili lanâ magis copiosâ, foliis undulatis et staturâ multò minore. (v. s. comm. à cl. Fisch. et Mey.)
20. T. FUSILLUM (Bieb. suppl. p. 521), glabrum infernè laxè floccosum, foliis subradicalibus linearibus basi subdilatatis integerrimis subtortilibus, caule 1-cephalo vix foliis longiori apice tereti, invol. circ. 8-phylo ligulis breviori aut subæquali. ♀ in collibus et campis apricis Armeniæ, Iberiæ (Bieb.), propè Baku (Mey.!), ad Karabagh et in distr. Khoi Persiæ (Szow.!). Refert var. minorem T. undulati. Folia stricta aut apice tortilia. Cor. pallidè flavæ, subtùs fusco-striatæ. Videtur ex Bieb. T. orientalis Stev. mem. soc. h. nat. mosc. 4. p. 59. (v. s.)
21. T. JUNCEUM (Wall. cat. n. 3257. comp. n. 367), glabrum aut vix basi sublanatum, foliis angustè linearibus carinatis basi dilatatis, radicalibus caulem flexuosum sæpè æquantibus, pedunculis teretibus, invol. 5-6-phylo corollis breviorè, achæniis breviter rostratis. ♀ in montibus excelsioribus Nepaliæ, ad Kamaon et in valle Deyra legit cl. Wallich. T. gracile Don mem. soc. wern. 3. p. 407. prod. fl. nep. p. 162. Flores lutei. Achænia exteriora lævia, interiora nunc lævia nunc muricato-scabra, omnia rôstro longiora. Caulis parcè foliosus, sæpiùs 1-cephalus, rariùs 2-cephalus. (v. s. comm. ab hon. cæt. merc. angl. Ind. or.)

† *Species non satis notæ.*

22. T. VILLOSUM (Linn. sp. 1110), totum villis albis pubescens ramosum, foliis longissimis acuminatis, pedunculis teretibus, invol. 9-phylo corollis radii sesquolongiore. ② in Hispaniâ (Linn.), Sibirîâ (Pall. itin. 2. p. 332). Cor. pallidè flavæ. Antheræ fuscæ. Achænia longè rostrata. †
23. T. ANGUSTIFOLIUM (Bell. in Willd. sp. 3. p. 1494), glabrum, foliis angustis strictis integris, pedunculis teretibus, invol. 8-phylo corollis radii longiore. ① in agro Nicaënsi (Bell.). Trag. parviflorum Horn. h. hafn. add. p. 970 ex Spreng. T. crocifolii var. ex Poir. †

†† *Species exclusæ.*

- T. ACULEATUM Moench. = Urospermum picroides.
 T. ASTERUM Linn. = Urospermum picroides β.
 T. BICOLOR Moench. = Urospermum Dalechampii.
 T. CAPENSE Jacq. = Urospermum Capense γ.
 T. CUSPIDATUM Steud. = Troximon marginatum.
 T. DALECHAMPII Linn. = Urospermum Dalechampii.
 T. FRITILLARIOIDES Less. = Picrosia longifolia.
 T. GLAUCUM Steud. = Troximon glaucum.
 T. LANATUM Linn. = Scorzonera lanata.
 T. PICROIDES Linn. = Urospermum picroides.
 T. VERTICILLATUM Lam. = Urospermum Dalechamp
 T. VIRGINICUM Linn. = Cynthia Virginica.