

CLXVII. TRAGOPOGON LINN. Spr. Syst. veg. 3 p. 366.

488. *T. floccosus* Kit. Spr. l. c. p. 662. In pratis promontorii caucasici (alt. 20 — 240 hexap.)
489. *T. roseus* Trevir. Spr. l. c. In collibus prope Baku.
490. *T. pusillus* M. a B. Spr. l. c. Cum antecedente.
491. *T. pratensis* Linn. Spr. l. c. In pratis promontorii caucasici (alt. 200 — 500 hexap.), in alpe Caucasi orientalis Tufandagh (alt. 1300 — 1400 hexap.); nec non in locis arenosis versus mare Caspium.  
*var.?* caule unifloro, pedunculis floccoso-tomentosis. In campis altiorum montium Talüsch (alt. 1000 hexap.)
492. *T. undulatus* Jacq. Spr. l. c. In campis prope Baku.
593. *T. crocifolius* Linn. Spr. l. c. p. 663. In collibus siccis petrosis montium Talüsch prope pagum Swant (alt. 670 hexap.)
494. *T. coloratus* mihi. T. glaber, anthodio 5partito flosculos (rubros) longe superante, pedunculis superne incrassatis, foliis lanceolato-linearibus planis strictis caule longioribus, pappo colorato (violaceo). Cum antecedente.
495. *T. major* Linn. Spr. l. c. In pratis versus mare Caspium inter Sallian et Lenkoran.

CLXVIII. APARGIA SCOP. *Leontodon* Cass. l. c. vol. 27 p. 1.

496. *A. hispida* Willd. Spr. Syst. veg. 3 p. 664. In pratis et campis herbidis promontorii caucasici et montis Beschtaw (alt. 150 — 800 hexap.); nec non in montibus Talüsch (alt. 900 hexap.)
497. *A. caucasica* M. a B. Spr. l. c. p. 665. In campis herbidis subalpinis versus montem Kasbek (alt. 800 — 1100 hexap.)

CLXIX. ASTEROTHRIX CASS. l. c. vol. 48 p. 434.

498. *A. asperrima* Cass. l. c. In locis lapidosis aridis montium Talüsch (alt. 270 — 800 hexap.)