

- ricatis rostro paulò longioribus, pappo violaceo-colorato. — in collibus siccis petrosis montium Talüsch Caucasi ad pagum Swant (Mey!), et in herbidis prov. Aderbeischan propè Badaban (Szow!). Herba 3-12-pollic. Cor. rubræ. (v. s. comm. à cl. Fisch. et Meyer.)
5. *T. ERIOSPERMUM* (Ten.! fl. med. 2. p. 3. fl. neap. prod. 3. p. 11. syll. p. 388), glabrum, foliis lato-linearibus strictis integerrimis, pedunculis subobconicis fistulosis, invol. circ. 10-phylo ligulas apice denticulatas subæquantibus, achæniis rostro ad basin pappi lanuginoso. (2) in pascuis humentibus agri Neapolitani (Guss!), propè Agnano et Tavoliere (Ten!). Affinis *T. crocifolio* quocum conjunxit cl. Reichenbach, sed præter notas in diagn. indicatas differt capitulo duplò majore, achæniis magis scabris, foliis latioribus, etc. Cor. purpureæ violaceæ. (v. s.)
6. *T. PORRIFOLIUM* (Linn. sp. 1110), glabrum, foliis strictis lanceolato-linearibus acuminatis integerrimis, pedunculis apice obconicis fistulosis, invol. 8-phylo ligulas apice rotundatas duplò ferè superante. (1) in collibus pratis Europæ et in hortis culinariis cultum. Jacq. ic. rar. t. 159. Fl. dan. t. 797. Engl. bot. t. 638. Schkuhr handb. t. 212. *T. sativum* Gat. fl. montaub. 136. *T. porrifolius* var. α . et β . Fries nov. ed. 2. p. 239. — Cam. epit. 313. ic. Flores roseo- aut flammeo-purpurascetes. (v. v. et s.)
7. *T. CUPANI* (Guss. ex Splith.! in litt. 1834), glabrum, foliis basi latè in vaginam concavam amplexicaulem dilatatis apice linearibus acuminatis integerrimis, pedunculis apice subincrassatis fistulosis, invol. 8-phylo ligulis longiore. — in monte Capato propè Panormum (Guss.! Splith!), in ins. Zacintho locis cultis (Marg!). Fl. aprili. Stirps speciosa! Caulis apice ramosus. Cor. purpurascetes. (v. s.)
8. *T. HIRsutUM* (Gou. fl. monsp. 342), caule foliisque subhirsutis, foliis lanceolato-linearibus acuminatis integerrimis strictis, pedunculo apice obconico fistuloso, invol. 12-phylo, corollis radii brevioribus, achæniis apice muricato-spinellosis rostrum circ. longitudine æquantibus. (2) in Galloprovincia (Gar. Ger.), et Occitania (Gou.). DC. fl. fr. n. 2990. Garid. aix 466. t. 106. *Geropogon hirsutum* Linn. sp. 1109 excl. syn. Col. Affine *T. majori*. Cor. flavæ. (v. s. c.)
- ** *Pedunculis teretibus.*
9. *T. UNDULATUM* (Jacq. ic. rar. t. 158), glabrum, foliis linearibus integerrimis undulatis apice tortilibus, pedunculis teretibus, invol. 8-10-phylo corollas obtusas æquante. (2) in pascuis montosis et subalpinis Carpathorum (Wahlenb.), Cappadociæ (Auch! n. 3322), Tauriæ (Bieb. Beup!), circà Astrachan (Gmel.). *T. revolutus* Schwæg. ex Gerh. in litt. *T. pratensis* γ Gaud. fl. helv. 5. p. 15. Cor. pallidè flavæ. Invol. post anthesin omninò reflexum. (v. s.)
- β . *orientale*, caule foliisque hinc indè floccoso-tomentosis. — Cum priore. *T. orientale* Linn. sp. 1109. *T. villosus* Habl. taur. p. 151 ex Bieb. taur. n. 1563. — Cam. epit. 312. ic. (v. s.)
10. *T. PRATENSE* (Linn. sp. 1109), glabrum, foliis subcarinatis integerrimis subundulatis basi dilatatis, pedunculo tereti, invol. 8-phylo ligulas apice truncatas subæquante. (2) in pratis Europæ et Orientis frequens. Ball. herb. t. 209. Lam. ill. t. 640. f. 2. Sow. engl. bot. t. 434. Gärtn. fr. 2. t. 159. Schkuhr handb. t. 214. — Fuchs. hist. 821. ic. Ligulæ flavæ subtus fusco striatæ aut ex Schkuhr pallidæ. (v. v. et s.)
- β . *criophorum*, caule præsertim ad apicem lanam floccosam gerente. — in pratis elatioribus Caucasi. *T. pratensis* var. β . C.-A. Mey.! enum. n. 491. *T. sinuatus* Avé pl. rar. p. 17? Ligulæ subtus purpurascetes. Herba 4-5-pollic. (v. s.)
11. *T. MINUS* (Fries nov. ed. 2. p. 241), glaberrimum, foliis è basi dilatata angustissimis canaliculatis flaccidis secundo-curvatis, pedunculis teretibus apice subincrassatis, invol. valdè ventricoso flosculis æqualibus duplò longiore. — in Sranie apricis argillaceis. *T. pratensis* var. minor. Fries nov. ed. 1. p. 95. Af-