

DIAGN. *Caulis ramosus. Folia carinata; oris undulatis. Calyce corollae radio aequales, aut breviores.*

Habitat in pratis.

Foliorum apices, quasi cirrhosi. Semen striis scabris angulatum; umbilico breviter pedicellato. Pappus expansus referens rete *Araneae aucupis*. Gestatio trium hebdomadarum.

947. TRAGOPOGON *Dubium.*

DIAGN. *Caulis uniflorus. Calyces flore longiores. Semiflosculi sulphurei.*

Habitat circa *Tergestum*, et *Schenoschetz*, in montibus.

Dissert a priore. 1. Foliis planioribus, non undulatis, nec apice cirrhosis. neque basi ventricosis. 2. Ramis nullis. 3. Radio calycinis segmentis breviore. 4. Diametro corollae unciali.

3II. SCORZONERA.

MATTH. CLUS. TOURN. I. R. H. p. 476.

Tab. 269.

Calyx oblongus, convergens, imbricatus squamis (ad 15). TOURN. l. c. Semina calyce duplo breviora cylindrica. LUDWIG. et coronata pappo plus minus plumoso, quo differt ab HIERACIO. ADANS. Folia oblonga, glabra, nervosa. RAI.

948. SCORZONERA *humilis.*

Scorzonera caule subnudo, unifloro; foliis lato-lanceolatis, nervosis, planis. LINN. *Syst. Nat.* p. 519. *Spec. Plant.* p. 790. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 685.

Scorzonera caule nudo, unifloro, foliis lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 10.

DIAGN. *Folia lanceolata, et nervosa, ut in PLANTAGINE lanceol. Scapus uniflorus, foliis paulo longior.*

Habitat in pratis, ad *Voiskam*, prope *Sacellum*.

Caulis