

incurvis, capitulo majusculo, involucri basi tomentelli phyllis 8 flosculis luteis concoloribus brevioribus, acheniis brevibus striatis crebre squamelloso-muricatis in rostrum eis triplo brevius sensim attenuatis ♂.

Hab. in pascuis siccis regionis alpinæ Anatoliæ, Olympus Bithynus (Auch 3333! Boiss!), montes Davros Pisidiæ et Anemas Lycaoniæ 6000' (Heldr!). Specimina Persica in Diagn. dubitanter citata huc non spectant.

Planta 3-4-rarius 6-7-pollicaris, radix tenuis longa nuda cujus terminationem non novi, folia radicalia 2-3-pollicaria 2 lineas lata, caule caule multo breviora, achenia 6-7 lineas longa.

24. *T. aureum*, parce floccosum tandem glabrum viride, radice tenuissime cylindricâ nudâ ramosâ, collo tenui vaginato-fibroso, caule pumilo simplicissimo ad medium folioso, foliis brevibus 7-9-nerviis acutis inferioribus lanceolatis basi longe attenuatis, superioribus amplexicaulibus oblongo-ellipticis acutis, capitulo magno, involucri phyllis 8-9 abbreviatis margine puberulis, flosculis marginalibus latis intense aureis involucro duplo longioribus, acheniis... ♂.

Hab. in collibus Ponti Lazici ad orientem montis Tcharantach sitis (Bal!). Fl. fine Julii.

Semipedale vel paulo procerius, folia 4-5 lineas lata, infima pollicaria sæpe obovata, sequentia cum petiolo 2-4 pollicaria, summa 12-15 lineas longa 5-6 lata, capitulum pulchre aureum illo *T. Orientalis* majus. Radice tenui sed certe perenni et foliis brevibus insigne.

25. *T. filifolium* (Rehmann MSS.) ad vaginas inferiores et folia radicalia lanatulo-ciliatum cæterum glabrum, radice tenui verticali, caulis ex collo fibroso 2-3 ascendentibus pumilis monocephalis parte dimidiâ inferiore foliatis, foliis anguste filiformibus flexuosis, caulinis in vaginam dilatatis, capitulis parvis, involucri phyllis 8-10 angustis acuminatis basi tomento detersili brevi obsitis externis 1-2 subbrevioribus, ligulis flavis involucrum quartâ parte superantibus, acheniis parvis angulatis ad angulos muricatis apice sensim brevissime et indistincte rostratis ♂.

Hab. in fissuris rupium colli Darial Caucasi (Rehmann!).

Folia radicalia 2-3 pollices longa dimidiâ lineam vix lata, caulinorum vagina sesquilineam lata, caules 8-10-pollicares, achenia 5 lineas longa, pappi achenio triplo brevioris setæ nonnullæ longiores apice scabræ. Species foliis angustissimis, acheniis breviter et obsolete rostratis insignis.

26. *T. erostre* (Boiss. et Haussk.) glabrum glaucescens, rhizomate suffrutescenti ramoso pluricipiti cespitoso-multicauli, caulis tenuibus elongatis inferne crebre foliosis simplicibus vel parte inferiori parce ramosis, foliis anguste linearibus trinerviis flexuosis, superioribus valde abbreviatis basi non dilatatis, pedunculis longis gracilibus non incrassatis, capitulis parvulis paucifloris, involucri phyllis quinis flosculis aureis tertiatâ parte brevioribus, acheniis brevissimis