

fine *T. pratensis*. *Cor. flavæ*, numerosiores quàm hujus, sed exter. non radiantes.

12. *T. CAMPESTRE* (Bess. enum. vohl. n. 1626), glabrum, foliis linearibus, radicalibus vix basi latioribus, caulinis basi latè vaginato-dilatatis, pedunculo vix subincrassato, invol. 8-phyllo flosculos superante, achæniis. . . . — in campis Bessarabiæ et Podoliæ australis (Bess.), in Tauriâ (Godet!). *Cor. ex Spreng. syst. 3. p. 663 flavæ*, ex specim. Godetiano sicco pallidæ et purpurascens. An nostra certè eadem ac Besseriana? An eadem ac *T. pratense*  $\beta$ ? (v. s. comm. à cl. Godet.)
13. *T. FLOCCOSUM* (W. et Kit. pl. rar. hung. 2. t. 112), floccoso-lanatum, caule erecto ramoso, foliis lineari-subulatis canaliculatis integerrimis, pedunculis teretibus, invol. 8-phyllo ligulis exterioribus brevioribus, achæniis sulcatis elongatis vix in rostrum attenuatis, costis supernè serrulatis. ② in arenosis subsylvaticis Hungariæ circà Pesth, etc. (Kit.), circà Astrachan (Trev.), in summo Libano? (Auch.! n. 3340), ad Tergestum (Reichenb.), ad margines agrorum distr. Khoi prov. Aderbeischan (Fisch. et Mey.), demùm in Borussia boreali si *T. heterospermum* Scheig. in Kœn. arch. nat. 1812. p. 229. huc ritè (etiã diffusum) relatum. *T. canus* Willd. sp. 3. p. 1493. *Habitus T. undulati et T. pratensis. Cor. flavæ.* (v. s.)
14. *T. GRAMINIFOLIUM*, glabrum aut rariùs hinc indè floccosum, caulibus è collo plurimis simplicibus sub capitulo teretibus tomentosis, foliis lanceolato-linearibus integerrimis acuminatis, invol. 8-phyllo corollis subbrevioribus, achæniis apice spinuloso-muricatis rostri longitudinem æquantibus. — in Imeretiâ legit cl. Szowitz. *T. Caucasicum* Fisch. et Mey.! non Bess. *Cor. flavæ* aut ex sicco in iisdem indiv. subpurpurascens. *Achænia* basi læviuscula 4-striata. (v. s. comm. à cl. Fisch. et Mey.)
15. *T. BREVIROSTRE*, glabrum, foliis lanceolato-linearibus acuminatis integerrimis, caulibus ramosis, ramis 1-cephalis apice teretibus nudis glabris, invol. circ. 8-phyllo floribus subæquali, achænio à basi spinuloso-muricato rostri longitudinem superante. — ad Caucasum. *T. Caucasicum* Bess.! in litt. non Szow. *Cor. ex sicco* vid. purpurascens? (v. s.)
- $\beta$ . *intermedium*, pedunculis sub capitulo tomentosis, corollis flavis. — in deserto Caucasico-caspico legit cl. Godet. *T. intermedius* Bess. enum. vohl. p. 83? ex Godet. (v. s.)
- $\gamma$ . *Podolicum*, caule ramoso, pedunculis glabris, foliis latioribus, rostro breviori — in pratis Podoliæ austr. et gub. Chersonensis. *Tr. Podolicus* Bess.! in litt. 1831. (v. s.)
- $\delta$ ? *Lithuanicum*, caule humili basi foliisque lanuginosis, pedunculo glabro, achæniis sublævibus. — in sabaletis Lithuanicæ. *Tr. Lithuanicum* Bess.! in litt. 1831. *Cor. flavæ.* An sp. propria, suad. cl. Bess.? (v. s.)
16. *T. CROCIFOLIUM* (Linn. sp. 1110), glabrum, foliis angustè linearibus strictis, pedunculis teretibus, invol. 5-6-phyllo ligulas paulò superantes, rostro ad originem pappi glaberrimo. ② in pratis apricis montosis Europæ australioris et Orientis. DC. fl. fr. n. 2992. — Col. ceph. t. 230. Flores violacei. *Achænia* muricato-scaberrima, rostro lævi apice etiã glabro. (v. v. et s.)
- $\beta$ . *flocculosum*, foliis supernè præsertim ad axillas floccoso-tomentosis. — cum var. *a.* (v. v. et s.)
17. *T. MUTABILE* (Jacq. ic. rar. 1. t. 157. misc. 2. p. 316), glabrum aut ad axillas et basin involucri vix lanatum, foliis semiamplexicaulis lanceolato-linearibus integris strictis acuminatis, pedunculis teretibus, invol. 8-phyllo corollas radii circ. æquante. ② circà Astrachan (Bieb. Stev.!). *Cor. nunc pallidè albentes, nunc flavidæ* aut rosæ lineis rubris striatæ. *Achæn. indeser.* (v. s.)
18. *T. RUBRUM* (S. G. Gmel. itin. 2. p. 198), junius arachnoideo-lanatum, caule erecto folioso, foliis lanceolato-linearibus subundulatis cauleque glaucis, pedunculis teretibus, invol. suboctophyllo corollis radii dimidiò brevioribus. ② in campestribus deserti Soongoro-Khurgisisi (Ledeb.), in hortis circà Astrachan