

*Tragopogon persicus* Boiss. Diagn. pl. or. VII. 4.

Karadagh unweit Alliar 24 Juli 1847 (florens et fructiferus). Albursgebirge bei Nur 17 und 18 Juni 1848, auch im Larthal bei Churchurä (florens), 20 Juni 1848. № 700 a.

*Tragopogon caucasicus* Bess. Mscr. Hohenack. Enum. pag. 43. Pl. exs. Un. itiner. Helenendorf!

Araxesebene bei Gamarlu, 29 April 1847 (florens). Betschenagh bei Nachitschewan, Mai 1847 (florens). Karadagh, Juli 1847 (florens). № 187.

Injuste hæc species a Cl. Dec. cum *Tr. brevirostri* conjuncta est; cf. Prodr. VII. 114. Ledeb. Fl. ross. II. 788.

*Tragopogon jesdianus* n. sp.

*Tr. glaber* glaucus caulibus virgatis dichotome ramosis, foliis e basi dilatata amplexicauli longissime et confertissime linearibus canaliculatis, supremis valde abbreviatis pedunculis non incrassatis, capitulis minutis, involuci phyllis 2 lanceolatis flosculos æquantibus, ligulis paucissimis carneis, achiniis (junioribus) lævibus brevisime rostratis apice rostri pilosulis.

Gebirge bei Jesd und Isfahan, bei den Dörfern Mehris, Gäsabad und Ssou, Mai 1849 (florens et fructiferus). № 1400/1.

Folia intermedia 8—10 pollices longa præter basin angustissima, capitula eis *Fr. brevirostris* minora, cui habitu affinis, sed a quo ligulis roseis aliisque notis differt.

*Tragopogon collinus* DC. Ledeb. Fl. ross. II. 789.

Ssahend-Hochgebirge, 9—1000 F. ü. d. M., 20 Juni 1847 (florens). Deh-ballo im Gebirge bei Jesd, 24 April 1849 (florens). № 1321.

*Tragopogon caricifolius* Boiss. Diagn. pl. or. VII. 4.

Gebirge im N von Isfahan bei Ssou, 21 und 22 Mai 1849 (florens et fructiferus).

*Tragopogon pusillus* M. Bieb. Ledeb. Fl. ross. II. 789.

Bei Nachitschewan, Mai 1847 (fructiferus). Iasiraseng in der Ebene zwischen Kasbie und Theran. September 1847.

*Scorzonera nana* n. sp.

Sc. (*Epilasia*) annua (?), radice cylindrica tenui, caule nano folioso araneoso 1—2 ramis lateralibus instructo, foliis oblongo-lanceolatis inferne attenuatis acutiusculis margine undulatis integris araneoso-lanatis, capitulis breviter cylindricis ad caulis et ramorum extremitatem solitariis, involuci exterioribus 2—3foliaceis linearibus interiora æquantibus, seu paullo superantibus, interioribus paucis ovato-lanceolatis subæquilongis acutis dorso pulverulentis margine membranaceis, ligulis flavescentibus ex involucro breviter exsertis, acheniis brevissimis costatis ad angulos