

want. Ad torrentem Göktschai in prov. Schirwan et prope Mingatschour in prov. Scheki.

*CEROPOGON glaber* L. In pratis prope pagum Aresch in prov. Scheki.

*TRAGOPOGON heterospermus* Schweigg. In campis argilloso-salsis prope oppidum Sallian.

*Ejusdem var. Tr. caucasicus* Bess. in lit. In pratis tr. Suwant et prope col. Helenendorf. Floret Julio m.

*Ejusdem var. Tr. pusillus* M. B. Ibidem. Floret vere.

*TR. macropogon* C. A. Mey. T. pedunculo apice subincrassato; periclinio flosculis vix longiore; achæniis (cum rostro) pappo triplo brevioribus, exterioribus tuberculatis: parte seminifera rostro brevior. (T. major C. A. Meyer Enum. pl. cauc. casp. N° 495, excl. syn.). Species pappo prælongo facile distinctissima. Corollulæ luteæ. In pratis arenosis ad mare Caspium prope pagum Kisilagatsch.

*TR. mutabilis* Jacqu. In rupestribus tr. Suwant. Floret Junio m.

*TR. major* Jacqu. Ibidem.

*TR. coloratus* C. A. Mey. (Enum. pl. cauc. casp. p. 64. 231.). Ibidem. Floret Junio, Julio m. Omnes species Tatarice: *Jemlik*, Armenice: *Chinds* et *Cheschne* appellantur.

*APARGIA hispida* W. In ditione Drych.