

6. A FEUILLES RUNCINÉES. *Runcinata*. NOB.

Feuilles radicales runcinées.

7. VELUE. *Hirsuta*. NOB. *Seriola atnensis*. LAFETR., *pyr. abr.*, p. 486 et *herb.* (NON LINN.)

Feuilles radicales plus ou moins velues.

H. Les lieux secs, sablonneux et pierreux, les champs secs des collines. R. *Toulouse* : les champs en face l'écluse du *Béarnais*, à *Guilheméry*. La var. 6. autour du bois de *Larramet* ; entre *Blagnac* et *Bauzelle*. La var. 7. à *Lasbordes* au bois d'*Aufrery*. (LAFETR.)

GENRE 55. — SALSIFIS.

Tragopogon. LINN.

Involucre oblong, simple, à 8-10 folioles imbriquées, scarieuses sur les bords. Réceptacle nu. Graines atténuées au sommet en un pédicelle délié, supportant une aigrette plumeuse.

Semences striées longitudinalement.

* *Fleurs jaunes.*

1. SALSIFIS ÉLEVÉ.

Tragopogon majus. ROTH., *germ.*, t. p. 332. *T. dubium*. VILL., *dauph.*, 3, p. 68. JACQ., *aust.*, t. 29. LAM., *ill.*, t. 646, f. 4.

Herbe. Tige ferme, ordinairement rameuse, glabre. Feuilles élargies à la base, amplexicaules, lancéolées-linéaires, allongées, entières, glabres. Calathides solitaires, terminales, sur un pédoncule fortement renflé au sommet ; involucre glabre, à 10-12 folioles lancéolées, aiguës, plus longues que les fleurs. BUS-ANN.

T. 1-2 pied. — Fl. grandes, d'un jaune-citron. — P. 3. E.

6. FALLACIEUX. *Decipiens*. NOB. *T. pratense*. LAFETR., *pyr. abr.*, p. 485 et *herb.* SAINT-AM. *fl. agen.*, p. 318 (NON LINN.)

Folioles de l'involucre ne dépassant par les fleurs.

H. Les prés, les bords des chemins, des champs, des vignes, les escarpemens des côteaux. C. C. *Toulouse*: prairies du *Touch*; à *Pech-David*.

Obs. La longueur des folioles de l'involucre employée pour différencier le *T. majus* du *T. pratense* est sans valeur.

On distinguera toujours sûrement le *T. majus* à ses feuilles moins acérées, planes, dépourvues de carène blanche; à ses pédoncules renflés, et au premier aspect, lorsqu'il est fleuri, par la couleur jaune-citron de ses fleurs qui sont d'un jaune de souci dans le salsifis des prés; celui-ci a, d'ailleurs, les pédoncules exactement cylindriques.

Le *T. pratense* est commun dans le Nord de la France; il semble manquer dans le Midi: l'espèce que l'on désigne sous ce nom est notre var. 6. du *T. majus*.

2. SALSIFIS A FUEILLES DE POIREAU.

Tragopogon porrifolium. LINN., *sp.*, 1140. JACQ., *icon. rar.*, t. 159. *Fl. dan.*, t. 797.

Herbe. Tige ferme, dressée, rameuse, glabre. Feuilles élargies à la base, courtes, lancéolées, entières, glabres. Calathides solitaires, terminales, sur des pédoncules renflés au sommet; involucre glabre, à 8-10 folioles étroites, lancéolées, aiguës, beaucoup plus longues que les fleurs. Bis-Ann.

T. 1-2 pieds. — Fl. grandes, violettes. — E.

H. Les prairies. R. *Toulouse*: A *Bourrassol*, le long du *Touch* entre *Saint-Martin* et *Blagnac*, les bords du *Canal du Midi*.

Obs. Cette plante est connue dans les potagers sous le nom de *salsifis blanc* à cause de la couleur de ses racines. Le *salsifis noir* des jardiniers est la *scorzonère d'Espagne*.

3. SALSIFIS A FEUILLES DE SAFRAN.

Trogopogon crocifolium. LINN., *sp.*, 1140.

Herbe. Tige ferme, dressée, rameuse, tomenteuse. Feuilles élar-