

umbellato, involucri foliolis exterioribus latioribus. Prope Elisabethgrad; Odessa (Besser, Eichwald).

2. *rigida*. Ledeb. (1826). Pilis glochidiatis simplicibusque intermixtis hispida, caule erecto stricto simplici v. subramoso: ramis erecto-adpressis apice tantum floriferis; foliis inferioribus oblongis dentatis; superioribus lanceolatis subintegerrimis undique setis adpersis; involucri turbinati v. campanulato-hemisphaerici foliolis adpressis oblongo-lanceolatis setis simplicibus adpressis hispidis; exterioribus brevibus; pappo involucre longiore; acheniis transverse rugosis. Florib. luteis. In sylvis pr. Elisabethgrad. Flor. Aug. ☉.

Ledeb. flor. ross. II. pag. 800.

Subtrib. V. *Scorzonereae*. C. H. Schultz. Pappus acheniorum omnium plumosus, plumulis radiorum intertextis; vel acheniorum marginalium paleaceus, paleis simplicibus; vel acheniorum omnium simplex, radiis serrulato-scabris et basi intus villosis, villis intertextis. Receptaculum nudum.

253. *Tragopogon*. L. Involucrum simplex, 8 — 12 phyllum; foliolis basi connatis. Achenium in rostrum attenuatum, intus non septatum. Pappus conformis plumosus, plumulis radiorum intertextis.

1. *major*. Jacq. (1773). ross: козелець, козлородникъ. Pedunculis sursum sensim incrassatis clavatis subanthesi crassitie baseos involucri; involucre subdodecaphyllo floribus longiore; capitulo supra concavo; acheniis marginalibus squamoso-muricatis acutangulis rostrum filiforme subaequantibus; foliis lanceolato-linearibus acuminatis strictis. Florib. flavis. In desertis, graminosis, agris et sylvis Flor. med. Maj. — med. Iun. ☉.

Ledeb. flor. ross. II. pag. 784. — Koch Syn. flor. germ. I. pag. 362. — Reichb. Icon flor. germ. XIX. 1388. fig. 2. 3.

*α. typicus* Lindm. Ubique vulgaris.

*β. desertorum* Lindm. (Prodr. flor. Chers. pag. 125): foliis angustioribus, involucri 10 — 14 phyllis.

2. *campestris*. Bess. (1822). Pedunculis sursum sensim incrassatis clavatis; involucri octophyllo floribus longiore; acheniis marginalibus spinuloso-muricatis rostro filiformi brevioribus; foliis e basi latiore amplexicauli lanceolato-linearibus acuminatis strictis. Florib. luteis. In desertis et campis. Flor. per totum Iunium. ☉.

Ledeb. flor. ross. II. pag. 784.

3. *pratensis*. L. Pedunculis aequalibus sub capitulo paulum incrassatis; involucri octophyllo, foliolis supra basin transverse impressis; floribus involucri aequantibus laevi brevioribusque; acheniis marginalibus rostrum filiforme aequantibus tuberculato-scabris; foliis e basi dilatata linearibus subulato-atenuatis strictis v. apice reflexis contortisque. Florib. flavis. In pratis et pascuis. Flor. fin. Maj. — fin. Oktobr. ☉.

Ledeb. flor. ross. II. pag. 785. — Koch Syn. flor. germ. I. pag. 362. — Kaufm. Мокр. фл. pag. 286. — Reichb. Icon. flor. germ. XIX. 1389. fig. 1. 2.

*β. tortilis* Koch (l. c.): foliis undulatis apice contortis.

4. *undulatus*. Jacq. (1781). Pedunculis aequalibus, involucri 8 — 10 phyllo flores aequante; acheniis spinuloso-muricatis brevissime rostratis v. erostratis; pappo acheniis cum rostro paulo longiore basi annulo villosa stipato; foliis lanceolato-linearibus, plus minus undulatis apice subrevolutis. Florib. pallide flavis. In pascuis et desertis. Flor. Iul. — Septbr. ☉.

Ledeb. flor. ross. II. pag. 786.

5. *orientalis*. L. Pedunculis aequalibus sub capitulo paulum incrassatis; involucri octophyllo, foliolis supra basin transverse impressis; floribus involucri plerumque longioribus; acheniis marginalibus rostro filiformi fere duplo longioribus