

Typus. RSS Ucr., ditio Transcarpatica, districtus Beregovensis, prope pag. Gatj, in prato, 16. et 17. VI. 1947, H. Bilyk. Kioviae conservatur.

6. *Tragopogon melanantherus* Klokov. species nova. — Series *Pseudo-orientales* Klokov.

Caules vulgo erecti 60—180 *cm* alti, foliiscum glaberrimi, supra medium ramificati. Folia radicalia necnon caulina inferiora taeniiformia vel lineari—lanceolata, ca. 15—35 *cm* longa, 2—14 *mm* lata, margine interdum undulata; folia superiora e basi dilatata oblongo-ovata in apicem linearem vel oblongo-lanceolatum attenuata, 2,5—15 *cm* longa et 2,5—15 *mm* lata (in parte inferiore), margine interdum undulata et hoc casu apice incurvata. Calathidia 5—12 (vel ultra), pedunculi sub calathidio 1—3 *mm* diametro, haud incrassati; involucrium 20—32 *mm* longum, 6—12 *mm* basi diametro et hoc loco paulum arachnoideum; involucri phylla 8, oblongo-vel lineari-lanceolata, ca. 3—5 *mm* lata, obtusiuscule acutata; flosculi marginales involucrio manifeste praestantes, ligulae eorum 17—23 *mm* longae, 3,5—4,5 *mm* latae, laete flavae, striis atratis nullis; antherarum tubulus ca. 5,5 *mm* longus, supra medium atribrunneus. Achenia fusiformia, 14—21 *mm* cum rostro longa, 0,8—1,5 *mm* diametro, subpentagona, in costulis squamulis minutis obsita, apice in rostrum achenio ipso subaequalem vel saepius manifeste brevius attenuata; pappus 11—17 *mm* longus achenio cum rostro semper brevior.

Floret VI—VII. Habitat in steppis pratorum vel ad margines silvarum in regionibus Ucrainiae septentrionalibus.

Typus. RSS Ucr., Kiovia, prope urbem, loco Golossejevo dicto, in querceto—carpineto, 6. VII 1952, M. Klokov. Kioviae conservatur.

7. *Tragopogon xanthantherus* Klokov. species nova. — Series *Pseudo-orientalis* Klokov.

Caules erecti, ca. 50—75 *cm* alti, foliiscum glaberrimi, plus minusve ramificati. Folia radicalia necnon caulina inferiora anguste linearia, ca. 10—25 *cm* longa, 3—5 *mm* lata; folia superiora e basi dilatata oblongo-ovata in apicem lineari-lanceolatum attenuata, 1,5—6,5 *cm* longa, 2—12 *mm* lata in parte inferiore, tenuiter acuminata. Calathidia 3—8, pedunculi sub calathidio 1—4 *mm* diametro, haud raro subincrassati; involucrium 20—32 *mm* longum, 6—15 *mm* basi diametro et hoc loco paulum arachnoideum; involucri phylla 8(9), oblongo-lanceolata, 3,5—7 *mm* lata, acuminata; flosculi marginales involucrio manifeste praestantes, ligulae eorum usque ad 25 *mm* longae, ca. 3—4 *mm* latae, laete flavae; antherarum tubulus ca. 5—6 *mm* longus, atriflavus, apice striis cinnamomescentibus. Achenia fusiformia, 16—22 *mm* cum rostro longa, 0,9—1,6 *mm* diametro, apice in rostrum achenio ipso sublongius attenuata; pappus 15—18 *mm* longus, fumaceus; achenia marginalia saepe arcuatim incurvata, pentagona, in costulis vel partim inter eos squamulis acutiusculis manifestis, ca. 0,2—0,3 *mm* longis obsita, cinnamomescenti-brunnea; mediana erecta, laeviuscula, flavida.