

Hab. in *Palæstina* loco non notato. (Boiss.)

Planta 2-5 pollicaria, folia majora 3 poll. longa 3 lin. lata valdè revoluta, capitula magnit. *Tr. Olympici* et *pumili*, achenium circ. 6 lin. longum. Affine *Tr. Olympic* quod statim dignoscitur foliis e basil atiori attenuatis, acheniis non angulatis et *Tr. acanthocarpo* quod differt caulis elatioribus ramosis, foliis integerrimis, acheniis ad angulos longiusculè aculeatis in rostrum crassius brevius sensim nec abruptè attenuatis.

TRAGOPOGON NERVULOSUM Boiss.

Tr. parcissimè floccosum tandem glabrescens glaucum, rhizomate tenui elongato subrepenti nudo, caule humili infernè densè folioso simplici vel ramulo aucto sub capitulo paululum incrassato, foliis omnibus a basi linearibus plicatis flexuosis margine integerrimo crispulis rigidiusculis elevatè multinerviis nervis albidis apice setaceo-attenuatis sèpè circinnatis, involuci phyllis 10 margine subundulatis lanceolatis acuminatis ligulas concolores flavas subæquantibus, acheniis subangulatis striatis obsoletè squamoso-muricatis apice sensim in rostrum eis brevius attenuatis, pappo sordido achenium æquanti.

Hab. in Libano circà *Eden*. Legi Julio 1846.

Planta 6-9 pollicaris, folia inferiora 3-4 poll. longa, 2-3 lin. lata, involuci fructiferi phylla sesquipollucem longa, achenium cum rostro 9 lin. longum. A *Tr. Palæstino* facile distinguitur foliis margine integris evidenter albo-nervosis, acheniis longioribus obsoletiùs aculeatis in rostrum brevius et crassius sensim attenuatis.

TRAGOPOGON CŒLESYRIACUM Boiss.

Tr. glaucescens pumilum, rhizomate tenui cylindrico, collo pluricipiti vaginis petiolorum stipato, foliis densè rosulatis e basi latiori plurinervi longè et tenuiter linearis-subulatis canaliculatis recurvis margine parcè lanato-hirtulis integerrimis, caulis scapiformibus foliis vix superantibus apice fistuloso-subincrassatis infernè folio uno altero obsitis, involuci phyllis 5 longissimis longè lanceolato-subulatis, acheniis teretibus striatis acutè squamelloso-muricatis in rostrum eis paulò longius attenuatis, pappo sordido achenio breviori.

Hab. in incultis *Cœlesyriæ* ubi legi fruct. Aug. 1846.

Caules 3-4 poll., involucrum 18-20 lin. longum, achenium 6 lin. ros-