

vix dilatata, involucrum plurifolium et achenia validiora acutè angulata aculeataque nec teretia læviuscula.

**TRAGOPOGON OLYMPICUM** Boiss.

Tr. glabrum basi simplex vel pluriceps, collo membranis petiolorum vetustorum stipato, rhizomate tenui verticali elongato, caulis pumilis infernè densiusculè foliosis, foliis infimis linearibus cæteris a basi latiori longè attenuatis rectis vel incurvis magine sæpè crispulis omnibus plurinerviis costâ mediâ latiori albidâ, capitulis mediocribus floriferis stellatîm patentibus, involuci phyllis 8 infernè albotomentellis demùm glabrescentibus lanceolatis subulato-acuminatis ligulis luteis concoloribus paulò brevioribus, acheniis brevibus teretiusculis striatis acutè squamelloso-muricatis in rostrum eis brevius sensim attenuatis ad pappi basin tomentellis, pappo rufescenti achenium subæquanti.

Hab. in pascuis siccis montium Anatoliæ, *Olympos Bithyno* (Boiss.), monte *Davros* Pisidiæ et *Anemas* Lycaoniæ alt. 6000' (Heldr.). Probab. quoquè hûc spectant specimina florifera e monte *Totschal* Persiæ borealis Kotschy N° 591. a. b. et c.

Caules 3-4 rariùs 6-7 pollicares, folia 1 1/2-2 poll. longa intermedia infernè 3-5 lin. lata, capitula magnit. Tr. *pusilli*, achenia 6-7 lin. longa. Affine præcedenti sed diversum caule pumilo, foliis brevioribus, acheniis non acutè angulatis. Habitu affine quoque Tr. *pusillo* MB. mihi quoad fructus ignoto sed hoc certè differt radice in tuberem oblongum infernè attenuatâ nec tenuiter cylindricâ, foliis angustiùs et multò longius linearibus capitulum æquantibus.

**TRAGOPOGON PALÆSTINUM** Boiss.

Tr. pumilum, rhizomate tenui verticali, collo parçè vaginato pluricipti, foliis omnibus a basi linearibus plurinerviis patulo-revolutis pli-catis margine undulatis et sub lente tenuissimè denticulato-scabridis apice attenuatis radicalibus confertis, caulinis paucis abbreviatis, caulis monocephalis folia vix superantibus apice non incrassatis, involuci phyllis 8-10 lanceolatis acuminatis ligulas concolores flavas non æquantibus, acheniis acutangulis ad angulos breviter squamoso-muricatis in rostrum eis subbreuius abruptè attenuatis, pappo sordido achenio æquilongo.