

Oxytropis montana DC.	Phaca australis L.	Saxifraga androsacea L.	Silene acaulis L.
Pedicularis Barrelieri Rchb.	frigida L.	mutata L.	Sonchus alpinus L.
foliosa L.	Phyteuma orbiculare L.	rotundifolia L.	Trifolium badium Schrb.
verticillata L.	Rhododendron ferrugineum L.	stellaris L.	spadiceum L.
Petasites albus. Gærtin.		Scutellaria alpina.	Trollius europæus L.
niveus Baumg.	Saussurea alpina DC.	Senecio alpinus Scop.	Veronica alpina L.
Phaca astragalina DC.	Saxifraga Aizoon Jacq.	Doronicum L.	saxatilis L.

*Rosa Regelii* Reut. mss (sect. Pisocarpæ Boiss. Fl. Or. mss.) ramis flexuosis, aculeis gracilibus rectis patentibus basi dilatato-compressis sub foliis geminis, stipulis linearibus apice acuminato-auriculatis patentibus, foliolis quinis aut septenis, ovatis, vel ellipticis, acutis, simpliciter serratis, subtus glaucis ad costam præsertim tenuiter puberulis, petiolo tenui tomentello parcissime et tenuiter aculeolato; floribus ad apices ramulorum solitariis vel plus minus umbellato-paniculatis, pedicellis gracilibus ut et tubo calycino ovato vel subgloboso, laciniis integris caudato acuminatis margine incano-tomentellis, petalis calyce paulo longioribus apice truncatis vel leviter emarginatis, stigmatibus brevibus hirsutis; fructibus parvis globosis rubris sepalis deciduis. — Habitat in Mandshonria Maximowicz secund cl. Regel in litt. ex sem. ab horto Imper. Petropolitano missis. Frutex 5-6 pedalis. Flores albi odoratissimi petala ad unguem flavescentia. Species pulchella valde distincta.

*Tragopogon orgyalis* Reut. cat. jard. Genev. 1863, biennes, glaucescens, caule procero ramoso, ramis erectis, foliis radicalibus linearibus acuminatis acute carinato-canaliculatis supra vittâ pallidâ notatis, caulinis e basi dilatata amplexicauli longe angustato-acuminatis, superioribus e basi ovata acuminatis, glabris vel ad axillas leviter floccosis; pedunculis sub capitulo incrassato-fistulosis, involucri glabri foliolis 10-12 lanceolatis longe acuminatis ligulas æquantibus vel eas vix superantibus; ligulis citrinis vel sulphureis extus pallide liviscentibus, antheris stylisque demum fuliginosis; achæniis crebre et tenuiter muricato-aculeatis rostro apice leviter barbato subbrevioribus. — Hab. in Lyciâ (Bourgeau). Caulis fistulosus 5-6 pedalis.

*Lactuca Kotschyana* Reut. cat. jard. Genev. 1864, perennis caule tereti albido ramoso-paniculato, foliis radicalibus obovato-oblongis subtus ad costam oculateis, caulinis oblongis vel ovatis auriculato-amplexicaulibus, omnibus margine ciliato-denticulatis; floribus magnis laxè paniculato-dichotomis, involucri glabri squamis lanceolatis ligulis flavis concoloribus duplo brevioribus; achæniis obovato-oblongis striatis rostro pappum æquantibus subbrevioribus. — Hab. in Armenia monte Bingöell Kotschy. *L. aculeata* Boiss. et Kotsch. pl. exsicc. ? Species radice perenni floribus magnitudinis Cichorii Intibi distinctissima. Variat in specim. spontaneis caule folisque valde aculeatis et in cultis subinermibus.

Genève, le 1<sup>er</sup> février 1868.

**W. NITZCHNER,**  
Horti inspector.

**REUTER,**  
Horti director.