

Ш. И. КУТАТЕЛАДЗЕ
НОВЫЕ ВИДЫ РОДА
TRAGOPOGON L. НА
КАВКАЗЕ

SCH. KUTHATHELADZE
GENERIS TRAGOPOGONIS
SPECIES CAUCASICAE
NOVAE

Tragopogon Otschiaurii Kuthath. sp. nova

Planta perennis glaberrima 40—75 alta. Collum residuis fibrosis foliorum emortuorum involucreto. Caules robusti, solitarii vel in numero 2, erecti basi rubescentes. Folia radicalia ad 32 cm lg. linearia. Folia caulina semiamplexicaulia basi valde dilatata apice sensim longe acuminata. Calathidia solitaria. Pedunculi crassi sub calathidiis haud incrassati. Flores lutei extus striis violaceis. Involucri phylla 8, glabra, lanceolata acheniis cum pappo breviora. Achenia marginalia costata ad costas tuberculata, achenia interna levia, omnia in rostrum acheniis 2,5—3 plo brevius sensim angustata. Rostri apice clavato-incrassati. Pappi minuti, breves fuscente-luteoli basi annulo, decidui acheniis cum rostro duplo breviores.

Typus. Georgia. Chevsurethia, Archoti, in viciniis p. Amga, in pratis subalpinis, 1800 m s. m. 11. VII. 1970, D. Otschiauri (TBI).

Affinitas. A *Tragopogon Charadzae* Kuthath. proxima est, sed caulibus robustioribus, foliis caulinis basi valde dilatatis, pedunculis sub calathidiis dilatatis, pappis fuscenti-luteolis minutis acheniis 2-plo brevioribus differt.

Многолетнее совершенно голое растение 40—75 см высоты. Корневая шейка голая или окутана волокнами прошлогодних отмерших листьев. Стебли мощные, одиночные или по два, прямые, на концах несущие по одной корзинке, у основания красноватые. Прикорневые листья длинные до 32 см длины, линейные; стеблевые листья полустеблеобъемлющие, от расширенного основания к верхушке постепенно длинно заостренные. Цветоносы толстые, но под корзинками не утолщенные. Цветки желтые, снаружи с фиолетовыми полосками. Листочков покрывала 8, голых, ланцетных, короче семян с хохолком. Краевые семянки ребристые и по ребрам бугорчатые, внутренние гладкие, все семянки постепенно суженные в носики в 2,5—3 раза короче семян. Носики на верхушке булавовидно утолщенные. Хохолки короткие, в 2 раза короче семян с носиком, буровато-желтоватые, у основания с кольцом, благодаря чему легко опадающие.

Тип: Хевсурети. Архоти. Окрестности сел. Амга. На субальпийских лугах 1800 м над у. м. 11. VII. 1970. Д. Очаури.

Родство. Описываемый вид стоит близко к *Tragopogon Charadzae* Kuthath. описанному в 1951 году с Ахалхевского района по сборам А. Харадзе и Л. Хинтибидзе. Но отличается от последнего мощными, у основания красновато окрашенными стеблями, сильно расширенными у основания




Рис. 1. *Tragopogon Otschiaurii* Kuthath.

стеблевыми листьями, толстыми цветоносами, мелкими, короткими в 2 раза короче семянков, буровато-желтыми хохолками, в то время как для *T. Charadzae* Kuthath. характерны более тонкие стебли, более узкие стеблевые

и прикорневые листья, цветоносы не расширенные под корзинками, неясно ребристые краевые семянки и желтовато-золотистые хохолки чуть короче семянок с носиком.

Tragopogon Leonidae Kuthath. sp. nova

Planta glabra 55—60 cm alta. Collum residuis foliorum emortuorum involucratum. Caules solitarii vel rarius 2 in numero, superne diffusivo-ramosi. Folia radicalia et caulina inferiora linearia basi dilatata. Folia caulina media




Рис. 2. *Tragopogon Leonidae* Kuthath.