

Семиречья и южной части Семипалатинской обл. Северовосточная граница этого вида еще не совсем выяснена. Повидимому, она приурочена к горным группам южносибирского водораздела, где ареал *T. songoricum* m. соприкасается с ареалом *T. orientale* L.

***Tragopogon paradoxum* S. Nik. sp. n.** — *Planta glabra. Folia caulinia plus minusve lata, linear-lanceolata, semiamplexicaulia. Pedunculi fructiferi sub capitulo clavato-incrassati, 8—12 mm in diam. Capitula fructifera magna, 65—90 mm longa, acheniis 50—60. Involucrum 8—9-phillum flosculos flavos leviter superans et achenis brevius vel subaequans. Achenia marginalia 40—50 mm longa subrecta, manifeste pentagona, costata, solum per costas apice verruculoso-tuberculata, inferne laevia, in rostrum tenue sulcatum sursum attenuata. Rositrum achenio longius vel aequale apice obscure breviter incrassatum, annulo praeditum. Achenia centralia pentagona leviter costata laevia rarissime superne vix exasperata. Pappus sordidus, achenio (cum rostro) vix brevior.*

Hab. in montibus Asiae Mediae: distr. Kugitang et Baldzhuan, necnon Kala-i-chum.

Type. — Buchara, Baldzhuan — Och-terek, 5. VIII. 1916, № 845, B. Fedtschenko.

Голое, крупное растение, более или менее разветвленное. Цветоносы 10—15 мм длиною, булавовидно-утолщенные, под корзинками 8—12 мм в диам. Стеблевые листья более или менее широкие, линейно-ланцетные, до 50 мм шириной, полустеблеобъемлющие. Корзинки при плодах 65—90 мм длиною, с 50—60 семянками. Обвертка из 8—9 листочек, внизу иногда по краю пленчатых, короче или равна семянкам, слегка превышает желтые цветы. Семянки краевые 40—50 мм длиною, слегка согнутые, ясно-пятигранные, ребристые, гладкие и только по ребрам в верхней части шершаво-буторчатые, с резким переходом в тонкий бороздчатый носик, который обычно длиннее или равен расширенной части семянки, наверху с полоской пушка и коротким мало выраженным желвачком. Внутренние семянки гранистые, слабо ребристые, гладкие или со слабо выраженной скульптурой в верхней части. Хохолок грязнобелый, короче семянки с носиком.

Этот вид значительно отличается от всех остальных видов рода *Tragopogon* слабым развитием скульптуры у краевых семянок.

В Гербарии Ботанического института Академии Наук имеется только три сбора этого вида: Таджикская ССР: Бальджуанский р-н, у пер. Ох-терек, 5. VII. 1916, № 1845, Б. А. Федченко; Дарваз, Кала-и-хум, каменистые склоны гор, 5. VI. 1897, № 1917, Коржинский. Туркменская ССР: Кугитанг, нижняя граница арчевого леса, в месте контакта с разнотравно-ковыльной ассоциацией, 4. VII. 1931, № 644, С. А. Невский.

***Tragopogon serawschanicum* S. Nik. sp. n.** — *Planta glabra. Caulis basi ramosus vel simplex. Folia caulinia late-lanceolata 10—20 mm lata, basi*