

Selinum Carvifolia L.	Sium siculum L.	Tagetes coronopifolia W.	Triticum pilosum Horn.
Senecio erucifolius L. Taur. 1)	Solanum aculeatissimum L.	tenuifolia Cav.	pruinatum H.
sarracenicus L.	ciliare W. En.	Talinum patens W.	turgidum W.
Serratula coronata L.	marginatum L.	Teucrium scordioides Schreb.	Valantia articulata L.
Seseli gracile W. K.	pinnatifidum Lam.	Scorodonia L.	Cucullaria L.
gummiferum Pall. 2)	scabrum Lag.	Thalictrum aquilegifolium L.	Verbascum formosum Stev.
petraeum M. B.	Solidago minuta L.	trigynum Fisch. 4)	nemorosum Schrad.
peucedanifolium Bess. 5)	Sorghum cernuum W.	Thlaspi Buxbaumii Fisch.	Steveni h. Vind.
Sida frutescens Cav.	rubens W.	Thymus graveolens M. B.	Verbena angustifolia Mich.
herbacea Cav.	saccharatum W.	Tordylium maximum L.	Verbesina dichotoma Murr.
jatrophoides W.	Stachys alpina L.	Tragopogon parviflorus	Veronica persica Poir.
mollissima Cav.	angustifolia M. B.	Fisch. 5)	urticaefolia L.
triangularis Humb.	polystachya Ten.	Tribulus terrestris L.	Vicia biennis L.
Silene saxatilis M. B.	pubescens Ten.	Trifolium alexandrinum L.	oroboides Wulf.
Silphium conjunctum W. En.	salvifolia Ten.	Bocconi Sav.	pisiformis L.
Sinapis brassicata L.	Statice Gmelini L.	Trigonella hybrida Pourr.	Zinnia multiflora L.
dissecta Lag.	oleaefolia Gou.	platycarpus L.	Zoëgea Leptaurea L.
Sisymbrium gallicum W. En.	speciosa W.	Triticum amyleum Ser.	
nitidulum Lag.	Symphytum tuberosum L.	Cevallos Lag.	
Sisyrinchium palmifolium L.	Synedrella nodiflora Pers.	intermedium Schrad.	

4) Planta e seminibus a Cl. Steven pr. Nikolajef lectis educata, a S. Jacobaea differt: fol. etiam radicalibus tripinnatifidis, lacin. linearibus utrinque lanatis; calyce villosa; radio longitudine disci dupla; rad. simplici nec stolonifera.

5) S. fol. tripinnatifidis glaucis venulosis; involucello submonophyllo longitudine umbellulae hemisphaericae; seminib. pubescentibus. Patria Tauria est. Non bene a Cel. Sprengelio (R. S. Syst. Veget. VI. 497.) cum Ses. peucedanifolio Bess. et S. dichotomo M. B. in unam speciem cogitur, sunt enim tres, caeque distinctissimae plantae. In hortis occurrit sub Bubone siculo; quod nomen, si quid video, prorsus delendum erit.

6) S. fol. triternatis, foliol. linearibus subulatis, umbellulis seminiferis contractis, involucella multipartita subaequantibus; fructu pubescente. Videtur, ex caractere, Ses. proliferum Spreng. Pag. II. 107.

7) Th. foliis subcordatis trilobis obtusis glabris; flor. erectis; semin. subternis compressis sulcatis. E Dahuria. Fischer. — Statura Th. minoris; caulis angulatus; radix simplex nec repens; panic. divaricata.

8) A T. pratensi L. vix differt nisi corollis calyce duplo brevioribus.

Handwritten text in German script, likely a letter or report, discussing botanical specimens and their characteristics. The text is dense and cursive, covering most of the lower half of the page.

Urselma 9. Jun.
1821.

L. C. Kurovinnov