

OBS. J'ai trouvé au col de Vars une centaurée voisine du *montana*, mais s'en distinguant principalement à la bordure étroite et aux cils courts des folioles de l'involucré, à ses achènes verdâtres à la maturité et non jaunâtres, à ombilic à peine barbu. Si ces caractères sont constants, on pourrait l'appeler *C. chlorosperma*.

J'ai du Mont-Cenis une autre forme bien distincte par la bordure des folioles du péricline large et à cils assez allongés dépassant ordinairement la largeur de la bordure. Ses achènes sont jaunâtres, étroits, presque régulièrement atténués du sommet à la base qui finit un peu en pointe ; son ombilic est assez fortement barbu : on pourrait l'appeler *C. stenocarpa*.

SAUSSUREA (DC.).

SAUSS. SAXATILIS (n.). — Cette plante, qui n'est probablement qu'une variété de la *S. depressa* (G. G.) des rochers humides, s'en distingue par sa tige presque droite plus élevée (1-2 décim.), plus lâchement feuillée, à feuilles plus glabrescentes, plus molles, plus allongées, les radicales souvent assez larges. — Aug.-sept.

HAB. Fentes des rochers humides au-dessus du lac Blanc (Grandes-Rousses) (l'abbé Faure) (n.).

TRAGOPOGON (L.).

TR. PERPUSILLUS (n.). — *Pedunculis æqualibus*
sub capitulo non conspicue incrassatis; involucro penta-
phylllo floribus breviore; acheniis marginalibus rostro
filiformi paulo longioribus obsolete tuberculato-scabris
vel sublævigatis; foliis e basi parum dilatata linearis

subulatis : caulis perpusillis. *Flores flavi.* — Jul.-Aug.

HAB. St-Paul de Vars (Basses-Alpes).

HIERACIUM (L.).

SECT. PILOSELLA (FRIES).

* S.-Sect. PILOSELLINA (Fries).

H. BIFLORUM (n.) pro synonymo CHAMÆAURANTICO-AURICULA (n.) an *H. FURCATUM* (Hopp.)? — *Caudice obliquo stolonibus gracilibus elongatis squamosis prostratis instructo*; caule subunifolio pilis elongatis gracilibus parce hirsuto superne stellulato-canescente pilisque glanduliferis obsito *furcato-bifloro* raro unifloro, *pedunculis erectis 6-12 centim. longis*; capitulis magis rotundatis et vulgo paulo majoribus quam in *H. chamæaurantiaco* (n.); involuci modice hirsuti *foliolis acutis*; foliis exterioribus obovatis interioribus elliptico-lanceolatis in petiolum angustatis, pilis elongatis gracilibus pubeque stellulata laxe obsitis; ligulis aurantiacis. — Jul.-aug. 2^e.

HAB. Grandes-Rousses : prairies au-dessus de Clavans; du col de Clavans aux bords de Sarrène (l'abbé Faure). R.

H. FLORENTOIDES (n.) pro synonymo FLORENTINO-PILOSELLA? — Ab *H. fallacino* (F. Sch.) differet videtur præcipue: *capitulis minoribus majoribus tamen quam in H. florentino* (All.); *stolonibus* (in speciminiis a me visis) *semper deficientibus*; *foliis lanceolatis vel lineari-lanceolatis*; *pubescentia stellulata præsertim caulina multo laxiore*; præterea ramo inferiore non