

nerviis margine saepius floccoso valde undulatis apice flexuosis, caulis 1-2 monocephalis folia radicalia non multum superantibus apice non incrassatis, involucri basi sublanati phyllis 8 lanceolatis acutis flosculis marginalibus luteis subbrevioribus, acheniis muricato-echinatis in rostrum eis triplo brevius apice lanatum abrupte attenuatis, pappo sordido achenium cum rostro aequanti.

Hab. in Armenia propè Erzeroum cl. Huet du Pavillon.

Caules 8-10 pollicares, folia radicalia 2 $\frac{1}{2}$ -3 lineas, caulina inferne 6-7 lineas lata, capitula magnitudinis eorum *T. Orientalis*. Achenium cum rostro 7-8 lineas longum. Hæc species collo vaginato ut *T. stenophyllum* donata ab eo fabricâ foliorum et involucri phyllorum longius differt et aptius propè *Tr. latifolium* collocanda quod collo non fibroso, foliis non heteromorphis, caule ramoso aliisque distat notis.

TRAGOPOGON PLANTAGINEUM Boiss. et Huet.

Tr. radice verticali cylindricâ, collo vaginis in fibras crassas tandem solutis vestito, caule humillimo folioso monocephalo, foliis glabris multinerviis margine scabridulis radicalibus oblongo-lanceolatis basi attenuatis caulinis e basi rotundatâ oblongis omnibus breviter attenuato-mucronatis, pedunculo lanato apice subincrassato foliis supremis breviori, involucri phyllis 8 lanceolatis margine undulatis acutis flosculos luteos aequantibus, acheniis....

Hab. in Armenia propè Elidja cl. Huet du Pavillon.

Planta ex unico specimine nota habitu valde singularis. Caulis vix semipedalis capitulum magnitudinis *Tr. pratensis* sed angustius ferens. Folia radicalia 3-3 $\frac{1}{2}$ pollices longa 10-15 lineas lata, folia caulina 3-4 inter se approximata bipollicaria subrecurva 12-13 lineas lata. Acheniis ignotis incerta affinitas sed prob. propè *Tr. latifolium* collocandum quod cæteris neglectis collo non fibroso et foliis lanuginosis differt.

Obs. *T. Cælesyriacum* Boiss. Diagn. № 11 re accuratius perpensa *Tr. eriospermo* Ten. inter omnes species generis magis affine videtur, ab eo staturâ pumilâ, pedunculis vix incrassatis, involucri phyllis quinis tantum differt et verosimiliter hujus tantum varietatem sistit.