

in Sardinia (Moris!), Græciâ (Zucc.), agro Mogadoriensi (Brouss.), in Hispaniâ circa Malagam (Boiss.), ins. Maderâ (Lowe!), Sicilia (Guss.), Italiâ (Col.), Tauriâ (Mey.), etc. *G. glaber* Jacq. h. vind. 1. t. 33. Schkuhr handb. t. 213. Geropogon australis Spreng. syst. 3. p. 663. — Col. ecphr. 1. p. 231. ic. (v. v. et s.)

† *Species exclusæ.*

- G. CALYCVLATUM* Linn. = *Scorzonera hirsuta*.  
*G. HIRSVTUM* All. = *Scorzonera hirsuta*.  
*G. HIRSVTUM* d'Urv. = ? *Tragopogon porrifolium*.  
*G. HIRSVTUM* Linn. = *Tragopogon hirsutum*.

DCCCX. TRAGOPOGON *Tourn. inst. t. 270. Scop. carn. ed. 2. v. 2. p. 44. Juss. gen. p. 170. DC. fl. fr. ed. 3. v. 4. p. 63. Cass. dict. 25. p. 64. Less. syn. 133. — Tragopogonis sp. Tourn. inst. p. 477. Linn. gen. n. 905. Lam. ill. t. 646. f. 1. et 2. Schkuhr handb. t. 214. f. 2. 3. 4.*

Capit. multiflorum. Invol. 1-seriale 8-16-phyllum, squamis imâ basi subconcretis demùm reflexis. Recept. epaleaceum foveolatum. Flosculi radii sæpè radiantés. Achæniâ estipitata, areolâ laterali donata, plûs minûs muricata, longè rostrata, rostro continuo sæpiûs lævi. Pappus pluriserialis plumosus conformis, setis subcorneis, quinis apice nudis longioribus. — Herbæ biennes aut perennes, Gerontogæ pleræque Europæ, habitu Scorzonæræ. Radices crassiusculæ valdè lactescentes. Caules erecti foliosi. Folia lanceolato-linearîa acuminata integrâ parallelinerviâ. Lana flosculosa hinc indè ad axillas caules aut apices pedunculorum obvia. Cor. nunc luteæ, nunc purpurascens, nunc ex his coloribus in iisdem speciebus variæ.

\* *Pedunculis apice obconicis fistulosis.*

1. *T. MAJUS* (Jacq. fl. austr. t. 29), glabrum, foliis strictis lanceolato-linearibus acuminatis integerrimis, pedunculis apice obconicis fistulosis, invol. 12-15-phyllis ligulis exterioribus superante, achæniis muricatis rostro subbreioribus. ② in arvis vineis et agris apricis Europæ, etiam in desertis Sinaicis (Bové!), ad mare Caspium (C. A. Mey.). Lam. ill. t. 646. f. 1. Schkuhr handb. t. 214. ic. fruct. *T. dubius* Scop. carn. n. 927. *T. porrifolius* var. C. Fries nov. ed. 2. p. 239. Flores flavi. Rostrum elongatum ad originem pappi torquari villosa instructum. Fortè var. *T. porrifolii* ex Fries. (v. v. et s.)
2. *T. LIVESCENS* (Bess. enum. pl. volh. n. 973), glabrum aut subflocculosum, foliis strictis lanceolato-linearibus acuminatis integerrimis, pedunculis obconicis fistulosis, invol. 8-9-phyllis flosculos radii vix æquantibus, achæniis spinelloso-muricatis rostro subbreioribus. — in Galliciâ ad Tyram propè Zaleszyki (Bess.), et in Tauriâ (Stev. ex Bess. in litt.). Corollæ discoloris, suprâ ochroleuci, subtùs lividi. An fortè *T. majoris* var. ? *Tr. dubius* Horn. h. hafn. add. p. 970 ex Spreng. syst. 3. p. 662. (v. s. comm. à cl. auct.)
3. *T. PTEROCARPUM*, glabrum, caule stricto subramoso, foliis lanceolato-linearibus planis strictis caule subbreioribus, pedunculis supernè incrassatis, invol. 6-7-phyllis, achæniis aliis (sterilibus) laviusculis supernè sensim attenuatis, aliis pentapteris muricatis abruptè rostratis. ② in Oriente ad radices montis Ak-Dag legit cl. Ancher pl. exs. n. 3317! Herba subglaucescens pappo apice violacea accedens ad *T. coloratam*, sed fructibus pentapteris ab eò et ab omnibus aliis distinctissima. (v. s. à cl. inv.)
4. *T. COLORATUM* (C.-A. Mey. enum. n. 494), glabrum, caule stricto subramoso, foliis lanceolato-linearibus planis strictis caule sæpiûs longioribus, pedunculis supernè incrassatis, invol. 5-phyllis flosculos longè superante, achæniis mu-