

ских. Ч. Расте по кршевима на Малом Штрпцу у Брајинској окренути северо истоку. V.

Разликује се од друге наше врсте, *J. mollis* L. тим, што јој средње лишће ободом низ стабло силази.

к 283 роду: *Centaurea* L.

*C. lugophylla* Gris. Стабло усправљено, од половине, ка што од основе гранато, лишће особито доње од густог маља пенељаво сиво, лирасто дељено, бочне кришке дугуљасте, вршне објајасте, горње лишће не дељено, дугуљасто, цветне главнице у обилату метлицу сложене, листићи омотача јајасте, од пола трепљави, врховима разведени, цвеће првено или бело; биљка од аршина у башчи од човечјег боја. Ч. Расте врло обилато у Врањском пољу. VII.

Спада у групу „*Ranunculatae*“ али је већа од свију наших врста а и тим пада у очи, што јој је доње лишће пенељаво сиво.

Приметба. По кршевима Старе планине — Три Чуке — расте биљка која такођер у ову групу спада, али је много мања, од педи и слаже се са описом *C. Olympica* Boiss., само што Boissier описује своју биљку као дво-годишњу, а наша је поуздано дуговечна.

Ваља да се по ново потражи а боље проучи.

к 291 роду: *Tragopogon* L.

*Tr. pterodes* Ранџ. Др. С. Петровић флора околине Ниша стр. 523. Паучинаст, стабло не дељено или ређе рачвасто, у горњем крају голо, дупке усправљено или бочна стабла устајућа, лишће проширеном

основом седеће, дугуљасто, заострљено, главичин омотач сложен из 6-8 ланцетастих, зашиљастих лисака, цвеће бледо љубичасто, од дужине омотача, ахеније на колуту ђошкасте, по ободу 5-криле и особито ове последње нагло истанчане у кљун дужини ахеније раван, перница нечисто беличаста, краћа од ахеније; биљка од чеपर्ка, нешто већа. ☉. Расте по присојним каменитим странама више Каменице, Матејеваца и Сићева у Нишевачкој. VI.

Од наших личи на *Tr. stenosifolius* L., али је трнатији, а цвет му је отворенији и зреле ахеније од крилатих греда у доњем крају јако трбасте.

*Tr. Tommasini* Schultz Bip. Паучинаст, стабло усправљено, ретко гранато, у цветну главицу поступно проширено, лишће широм основом седеће, ланцетасто, на врху заострљено, кашто усукано, цветни омотач из 8 линеарних, завршкастих лисака сложен, цвеће жуто, од дужине омотача, ахеније истанчане у кљун један и по пута дужи од ахеније, на врху задебљао и кунадрост, ахеније од уздужних греда цртасте, а између греда од попречних љускица не једнаке, перница не чисто бела. ☉. Расте по кршевима око Мокре Горе у Ужичкој. VI.

Од наших је најсроднији са *Tr. Orientale* L., али се од њега разликује дужином кљуна, а и тим, што му је кљун на врху длакав.

к 292 роду: *Scorzonera* L.

*Sc. stricta* Horn. Корен подебео, дупке у земљу силазећи, стабло усправљено, особито у доњем пола густо листато, од пола рачвасто гранато, лишће јајасто ланцетасто, в врху зашиљасто, оздо кратко длакаво,