

1563*. TRAGOPOGON *pufillus*.

Tr. calycibus corollâ brevioribus, pedunculo aequali, foliis linearibus basi amplexicauli dilatatis glabriusculis, caule subunifloro.

Tr. orientalis? Steuen in mem. soc. nat. eur. mosq. 4. p. 59.

Habitat in collibus Armeniae ibericas australioris ad rimum Dsegam, nec non in campis apricis Iberiae occidentalis circa Gori.

Resert varietatem pygmaeam Tr. undulati. *Caulis* palmaris simplicissimus uniflorus usque ad medium foliosus. *Folia* caulem aequantia aut superantia, praeter basin anguste linearia, juniora apicem versus undulata. *Pedunculus* sub flore vix incrassatus. *Flos* magnitudine Tr. undulati. *Corollulae* pallide flavae argute 5-denticulatae: subtus striis 5 fuscis. *Antherae* fuscae. Notis a Steueno loc. cit. indicatis diversitas a Tr. orientali extra dubium ponitur.

1564. TRAGOPOGON *major*.

Corollulas apice rotundatas non video in meis, sed apicem versus angustiores: denticulis apicis 5 minimis nigro marginatis.

1568. SCORZONERA *taurica*.

Synonyma adde: Catal. hort. gorenk. a. 1812. p. 34. Beffer catal. hort. cremen. a. 1816. p. 126.

Semina incana costata: costis apicem versus denticulato-scabris. Varrietatem totam lanugine canescenatem legi in collibus calcareis Borystheni vicinis, inter Cherfon et Berislaf; et alteram angustifoliam subunifloram circa acidulam Nartsanensem lectam amiciss. Steuen mihi communicavit.