

phyllis 8 e basi latâ linearî subulatis flores marginales non æquantibus flexuosis, corollis luteis, acheniis...

Hab. in Armenia propè Tortoum cl. Huet du Pavillon Junio 1853.

Radix crassiuscula tunicata fasciculos foliorum caulesque plures floriferos sub anthesi 8–9 pollicares edens. Folia supernè vix lineam lata, caulinorum pars dilatata sæpè pollicaris lato-linearis. Capitula eis *Tr. pratensis* ferè minora. Species collo tunicato, foliis tenuissimis, involucrique phyllis setaceo-acuminatis insignis habitu *Tr. caricifolium* Boiss. quodam modò referens quod floribus roseis, foliis latioribus, etc. cæterùm longè differt. Affinitas ob achenia non nota incerta.

TRAGOPOGON LONGIFOLIUM Heldr. et Sartori.

Tr. glabrum, radicis cylindricæ collo nudo caulem sæpiùs unicum elatum striatum rubellum ramosum edenti, foliis radicalibus caulinisque inferioribus plurinerviis lincaribus strictis apice attenuatis callosis, pedunculis elongatis rigidis supernè vix incrassatis foliis brevibus lanceolatis strictis obsitis, capitulis parvis, involucri basi subpulverulenti cæterùm glabri octophylli phyllis lanceolatis acutis flosculos marginales æquantibus, flosculis luteis subtùs sublivescentibus, acheniis brevibus læviusculis spinuloso-muricatisve in rostrum eis triplò breviùs apice villosum attenuatis, pappo sordido achenium cum rostro æquanti.

Hab. in maritimis *Phaleri* Atticæ inter Juncos cl. Th. de Heldreich.

Folia inferiora pedalia sesquipedaliave sesquilineam lata. Caules tandem 2-2 $\frac{1}{2}$ pedales. Achenia cum rostro 5 lineas longa. Valdè affine *Tr. brevirostri* DC. a quo differt foliis longioribus nunquam floccosis nec undulatis, acheniis brevioribus apice minùs tenuiter et breviùs rostratis, caulis præterea minùs ramosus et folia ramea basi minùs dilatata.

TRAGOPOGON RETICULATUM Boiss. et Huet.

Tr. radice cylindricâ verticali, collo vaginis reticulato-foliosis vestito, foliis radicalibus linearibus supernè longè attenuatis, caulinis e basi dilatatâ oblongâ attenuato-acuminatis, omnibus pluri-

nerviis margine saepius floccoso valde undulatis apice flexuosis, caulis 1-2 monocephalis folia radicalia non multum superantibus apice non incrassatis, involucri basi sublanati phyllis 8 lanceolatis acutis flosculis marginalibus luteis subbrevioribus, acheniis muricato-echinatis in rostrum eis triplo brevius apice lanatum abrupte attenuatis, pappo sordido achenium cum rostro aequanti.

Hab. in Armenia propè Erzeroum cl. Huet du Pavillon.

Caules 8-10 pollicares, folia radicalia 2 $\frac{1}{2}$ -3 lineas, caulina inferne 6-7 lineas lata, capitula magnitudinis eorum *T. Orientalis*. Achenium cum rostro 7-8 lineas longum. Hæc species collo vaginato ut *T. stenophyllum* donata ab eo fabricâ foliorum et involucri phyllorum longius differt et aptius propè *Tr. latifolium* collocanda quod collo non fibroso, foliis non heteromorphis, caule ramoso aliisque distat notis.

TRAGOPOGON PLANTAGINEUM Boiss. et Huet.

Tr. radice verticali cylindricâ, collo vaginis in fibras crassas tandem solutis vestito, caule humillimo folioso monocephalo, foliis glabris multinerviis margine scabridulis radicalibus oblongo-lanceolatis basi attenuatis caulinis e basi rotundatâ oblongis omnibus breviter attenuato-mucronatis, pedunculo lanato apice subincrassato foliis supremis breviori, involucri phyllis 8 lanceolatis margine undulatis acutis flosculos luteos aequantibus, acheniis....

Hab. in Armenia propè Elidja cl. Huet du Pavillon.

Planta ex unico specimine nota habitu valde singularis. Caulis vix semipedalis capitulum magnitudinis *Tr. pratensis* sed angustius ferens. Folia radicalia 3-3 $\frac{1}{2}$ pollices longa 10-15 lineas lata, folia caulina 3-4 inter se approximata bipollicaria subrecurva 12-13 lineas lata. Acheniis ignotis incerta affinitas sed prob. propè *Tr. latifolium* collocandum quod cæteris neglectis collo non fibroso et foliis lanuginosis differt.

Obs. *T. Cælesyriacum* Boiss. Diagn. № 11 re accuratius perpens à *Tr. eriospermo* Ten. inter omnes species generis magis affine videtur, ab eo staturâ pumilâ, pedunculis vix incrassatis, involucri phyllis quinis tantum differt et verosimiliter hujus tantum varietatem sistit.