

Leontodon hispidulus (Del.) Boiss. β) *tenuilobus* Boiss. — Boiss. fl. Or. III, 728. — *Millina Persica* Boiss. Diag. I, 7. pag. 3. — Extra fines Persiae:

In planitie Euphrati fluvii inter Anah et Deir (versus Palmyra); 6. V. 1894.

Picris strigosa M. B. — Boiss. fl. Or. III, 736.

Sultanabad, prope Girdu; 3. VII. 1892. — Prope Douletabad; 1896. — In monte Latetar; 10. VI. 1895. — In monte Raswend; VIII. 1899.

Tragopogon longirostris Bisch. — Boiss. fl. Or. III, 745.

Sultanabad, sine indicatione loci speciali; 1899 (c. fructu).

Berichtigung: Die von mir bei Amasia in Kleinasien im Jahre 1889 gesammelte und als *T. longirostris* Bisch. ausgegebene Pflanze gehört nicht zum Typus, sondern stellt die var. β) *Djimilense* (C. Koch pr. sp.) Bornm. (= β . *abbreviata* Boiss.) dar.

Tragopogon collinus DC. — Boiss. fl. Or. III, 746.

Sultanabad, in collibus; 1890. — Ibidem, prope Indschidan; V. 1894. — In montibus Tefresch (inter Sultanabad et Kum); VIII. 1898.

β) *latifolius* Bornm. in exsicc. iter Persico-turcic. 1892–93 no. 4099 (edit. 1895) e flora Persiae austr. (Kuh-Nasr, prope Kerman, 2700 m s. m.; 23. V. 1892 legi).

Sultanabad; 1890. — Hamadan, in montibus Karaghan; VII. 1899. — Nehawend, in montosis; 15. VII. 1895.

Die Blätter dieser auffallenden Varietät sind mitunter bis 15 mm breit, doch scheinen Übergangsformen vorzukommen. Eine aus der Umgebung von Baku mit der Bezeichnung *T. ruber* Gmelin im Herbar Haussknecht aufliegende Pflanze ist von den Straussischen Exemplaren nicht verschieden. Boissier führt aus der Flora von Baku indessen nur *T. collinus* DC. (α . *typicus* fol. anguste linearibus) an. Vielleicht ist β . *latifolius* Bornm. identisch mit *T. ruber* Gmelin, einer aus der „Flora Orientalis“ bisher noch nicht nachgewiesenen, anscheinend aber in Persien weitverbreiteten Art.

Tragopogon Straussii Bornm. subsp. nov.

Sect. *Rubriflori*, aff. *T. colorato* C. A. M. — Bienne, caule crasso brevi ad basin stricte breviterque ramoso, ramis foliosis congestis; foliis glabris, anguste linearibus, longissimis, basi amplexicaulibus; pedunculis brevibus, incrassato-clavatis; involucris phyllis 6–7, flosculos purpureos superantibus; acheniis ad costas creberrime muricato-lamellatis, in rostrum aequilongum (non eo longius) apice non clavatum attenuatis; pappo sordido (non violaceo).

Sultanabad, in monte Raswend; 1890 et (ut videtur ex eodem loco) 1899.

Tragopogon buphthalmoides (DC. 1838 sub *Scorzonera*) Boiss. — Boiss. fl. Or. III, 751.

α) *Persicus* (Boiss. Diagn. I, 7, pag. 4; 1846; pr. spec.) Bornm. (= β . *stenophyllum* Boiss. fl. Or.).

In monte Raswend; 13. VI. 1890. — Luristania, in monte Schuturunkuh; 20. VI. 1889 et VII. 1898.