

zu bezeichnen, denn Prantl versäumte es, dem Namen *Sch. Bornmülleri* Prantl die kurze Notiz beizufügen „syn. *Sch. Podolica* Boiss. Fl. Or. (descriptio!), non Besser“. Daß Boissiers Beschreibung tatsächlich nach dem Wiedemanschen Exemplar entworfen ist, geht unzweideutig bei Beschreibung des gänzlich verschiedenen Indumentes beider Arten hervor, denn dieses besteht bei echter *Sch. Podolica* Besser (Zinger exsicc. aus Süd-Rußland; Kerners Fl. exsicc. Austro-Hung. etc. aus Galizien) aus einem ganz kurzen dichtstehenden, die Pflanze teilweise aschgrau-färbenden Sternfilz, während Boissier die anatolische Pflanze „pilis simplicibus et furcatis hirta“ schildert, mit Stengelblättern, die er „oblongo-linearia subintegra“ nennt. Diese sind bei der Besserschen Pflanze breit, eiförmig und tief gezähnt, denen einer *Draba muralis* L. oder *Arabis alpina* L. nicht unähnlich. Offenbar hat Boissier nur ein sehr dürftiges Material der Wiedemanschen Pflanze vorgelegen, sonst wäre ihm die spezifische Verschiedenheit beider Pflanzen sofort aufgefallen.

Es ergibt sich also die Synonymik wie folgt:

- 1867 „*Schivereckia Podolica*“ Boiss. Fl. Or. I, 291 (non Besser), descriptio et planta a Wiedemann a. 1840 in Anatolia in m. Ilkhas-dagh lecta.
- 1889 *Draba Bornmülleri* Prantl in Bornm. pl. Anat. exsicc. n. 358 (Ak-dagh [in. reg. alpina] pr. Amasia 18. VI. fruct.)
- 1890 *Schivereckia Bornmülleri* Prantl in Bornm. pl. Anat. exsicc. n. 1806 (Ak-dagh 19—2200 m. 23. V. flor. et 14. VII. fruct. 1890, n. 1806 b (Paphlagonia, in summo monte Ilkhags-dagh, 23—2600 m.; 11. VIII. 1890).
- 1891 *Schivereckia Bornmülleri* Prantl in Engler, Natürl. Pflanzenform. III, 2 p. 190 (nomen nudum).
- 1892 „*Schivereckia Podolica* Boiss.“ Haussknecht in Sintenis exs. n. 4031 (Ilkhas-dagh, 28. V. und 23. VII. 1892).
- 1892 *Draba Dörfleri* Wettstein in Beitr. z. Fl. von Albanien S. 22 (Bibliotheca botanica Heft 26; 1892) Tafel I. fig. 4—8. — Macedonien (Albanien): Šar-dagh (m. Scardus), Ljubatrin (Ljubitrn). 2500 m.
- 1905 *Schivereckia Bornmülleri* Prantl in Bornm., Mitt. d. Thüring. Botan. Ver., n. Folge, XX. S. 6—7. (1904—1905); descriptio plantae Anatoliae.
- 1920 *Schivereckia Dörfleri* (Wettst.) Bornm. (comb. nov.)

## X. (LXXXVII). Zwei neue *Tragopogon*-Arten.

Von Dr. August Hayek.

### 1. *Tragopogon Stribnyi* Hayek, spec. nov.

Biennis, radice verticali crassa. Caulis erectus, in parte superiore in ramos nonnullos monocephalos divisus, in parte inferiore floccoso-lanatus, in parte superiore glaber. Folia inferiora leviter lanata, larceolata, lorge-acuminata, basin versus angustata, 2—4 cm lata, 11—13 nervia, margine ± undulato crispa, media et superiora e basi dilatata ovata amplexicauli in laminam lanceolato-acuminatam margine undulato-crispam apice saepe circinato-recurvam attenuata. Pedunculi glabri apice vix incrassati.

Involucri squamae octonae florendi tempore 11 mm longae basi minute puberulae, floribus flavis subbreiores. Achenia dense seriatim muricata in rostrum laevem apice parum dilatatum eis aequilongum attenuata.

Bulgaria: In vinetis et collinis ad Papakli, leg. Střibrny a. 1906 et 1909.

Differt a *T. elatiore* Stev., sub quo nomine a collectore distributus est, imprimis acheniis in rostram fere aequilongum attenuatis, cum in *T. elatiore* fere erostra sint. A *T. orientali* L. et *T. pratensi* L. foliis margine undulato-crispis differt.

## 2. *Tragopogon transsilvanicus* Hayek, spec. nov.

Biennis, radice verticali crassa apice fibroso-squamosa. Caulis elatus validus ad 1 m fere altus glaber in parte superiore in ramos nonnullos simplices divisus. Folia glabra, inferiora oblongo-lanceolata, 30—50 mm lata, 11—13 nervia, longe acuminata, basin versus vix attenuata vaginato-amplexicaulia, margine plana, superiora e basi ovata amplexicauli in laminam lanceolatam acutam brevem sensim acuminata. Pedunculi apice non incrassati. Squamae involucri octonae; florendi tempore fere 3 cm longae. Floreis aurei, involucrum tertia parte superantes. Achenia grisea, apicem versus seriatim muricata, in rostrum tenuem sublongiorem apice non incrassatum attenuata.

Transsilvania: In pratis „Heuwiesen“ („szenafü“) prope Klausenburg legi ipse 9. Julio 1913.

Macedonia centralis: In graminosis prope Allchar, leg. J. Dörfler (Iter Alb. secundum no. 219 sub *T. rumelico*).

Habitu priori non dissimilis, sed statura robustiore, glabritie, capitulis maioribus et imprimis acheniorum rostro tenui elongato et foliis margine non undulato crispis diversum. Habitu speciminibus validis *T. orientalis* L. non dissimilis, sed foliis latissimis et acheniorum rostro elongato tenui facile distinguendus. A *T. rumelico* Vel. iisdem notis discrepat.

## XI. (LXXXVIII). L. Gross,

*Viola pumila* Chaix × *silvestris* (Lmk. p. p.) Rchb. hybr. nov.

= *V. Gerstlaueri* L. Gross.

Planta perraro rosulans.

Caulis complures erecti vel ascendentes 5—15 (—25) cm, in statu aestivo ad 35 cm alti, in infima parte sordide violacei.

Stipulae ± foliaceae, longe acuminatae, saepius longifimbriatae-dentatae, plerumque marginibus brevissime setoso-hispidis sicut in *V. pumila*.

Folia glaberrima vel subglaberrima, infima circiter 1 cm longa et 0,5 cm lata, elliptica vel e basi ± truncata rotundiuscula, obtusa vel manifeste acutiuscula, superiora e basi plane cordata oblongo-ovata vel