

Floret VI—VII. Habitat in declivibus steppaceis vel lapidosis taūricis.

Type s. RSS Ucr., ditio Taurica, Tauria meridionalis, Jalta major, Hortus botanicus Nikitensis, in declivibus sponte, 23. VII 1955, M. Klokov. Kioviae conservatur.

Affinitas. A. *T. majore* Jacq. flosculis marginalibus involucro subaequilongis, non manifeste brevioribus, achenis crassioribus, non 0,8—1,8 mm diametro, marginalibus squamulis majusculis, non solum usque ad 0,3 mm longis, obsitis, medianis squamulosis, non laevibus vel laeviusculis, recedit.

15. *Tragopogon tesquicola* Klok. species nova. — Series *Dubii* Klok.

Caules erecti 25—110 cm alti, in parte inferiore foliiscum densiuscule flocculoso-arachnoidei, supra medium ramificati vel haud raro simplices. Folia radicalia necnon caulina inferiora linearia vel saepius anguste linearia, usque ad 15—35 cm longa, 1—5 mm lata, tenuiter acuminata; folia superiores e basi oblonga vel oblongo-ovata in apicem linearem vel anguste linearem abrupte attenuata, 4—20 cm longa, 3—20 mm lata (basi), tenuiter acuminata. Pedunculi sub calathidio incrassati, obconici, 3—9 mm diametro; involucrum 3—6 cm longum, 8—15 mm basi diametro; involucri phylla in numero 8—12(14), oblongo-lanceolata, 3—6 mm lata, tenuiter acuminata vel interdum attenuato-acutata, sub anthesin plus minusve arachnoidea; flosculi flavi, marginales involucro subaequilongi, ligulae eorum 18—21 mm longae, 2,7—4 mm latae denticulis 0,5—0,7 mm longis; antherarum tubulus ca. 5—6 mm longus, nigricans. Achenia fusiformia, 23—34 mm cum rostro longa, 1,2—2,5 mm diametro, plus minusve incurvata, pentagona, in costis omnia vel marginalia squamulis acutiusculis 0,5—1 mm longis et inter eos minoribus et obtusioribus obsita, apice in rostrum tetragonum 0,4—0,6 mm crassum achenio ipso subaequilongum sensim attenuata; pappus 20—32 mm longus, albidus vel albido-fumanus, subargentatus.

Floret VI—VII. Habitat in declivibus steppaceis vel lapidosis Ucrainiae meridionali-occidentalis.

Type s. RSS Ucr., Odessa, in declivibus littoralibus infra Hortum botanicum, 18. V 1952, M. Klokov. Kioviae conservatur.

Affinitas. A. *T. taurico* Klok. caulis in parte inferiore atque foliis inferioribus manifeste flocculoso-arachnoideis, non glabris vel glabriuscis, involucro 6—14-, non 5—8-phyllo, achenis sub rostro arcuatim incurvatis, non strictis vel solum basi incurvatis, squamulis patentibus acutiusculis, non semiadpressis obtusiusculis, obsitis, rostro tetragono, haud octogono, tenuiore et longiore abhorret.

16. *Crepis planitierum* Klok. species nova. — *C. succisifolia* auct. f. l. ucr. non Taussch.

Planta perennis rhizomate abbreviato obsoleto, radice fibrillosa. Caules solitarii vel 2—3-ni erecti, 45—90 cm alti, superne solum ramificati, cala-