

seriei exterioris interiore duplo brevioribus. — Auf dem Kapellenberg bei Kronstadt. Kalk. Jul. Aug. 2500'. — (Nach getrockneten Exemplaren bestimmt.)

2043. *P. oligocephala* Schur herb. Transs. Caule gracili 10—15 poll. simplici vel superne subramoso, oligocephalo-subcorymboso, sulcato, hispido. Foliis infimis elongato-oblongis, petiolatis; caulinis duplo angustioribus a basi lata subcordata sensim attenuatis sessilibus; omnibus cauleque pilis fuscis vel apice albis inaequalibus glachidiatis hispidis. Anthodiis praecedenti similibus sed peranthodii foliolis dorso setoso-hispidis. Fructibus fuscis curvatis, lamellato-rugosis, sub pappo constrictis. — Affinis *P. Villarsii* Jord. et *P. pauciflora* Willd. mihi esse videtur. (Nach trockenen Exemplaren bestimmt!) Auf den Kalklokalitäten bei Kronstadt, Gerölle, Piatra mare, Temöser Pass. Jul. 1854.

Subtribus IV. SCORZONERAEAE C. H. Schultz.

445. TRAGOPOGON L.

2044. *T. porrifolius* L. sp. 1110. — Koch syn. ed. 2, 485. — Jacq. icon. rar. t. 159. — Schkh. t. 214. — Auf Gartenschutt bei Heltau. Jul. 1847.

2045. *T. transsilvanicus* Schur herb. Transs. — Radice valida descendente multiplicite (perenni ut mihi videtur) caules numerosos florentes fasciculosque foliorum proferente. Caulibus 2 ped. a basi parum ramosis, ramis longissimis foliatis monocephalis cauleque ad axillas et basin anthodio magis minusve arochnoides-lanatis. Foliis elongato-oblongis glabris interdum pruinosis porrectis margine serrulato-scabris. Pedunculis sub anthodio non incrassatis. Anthodiis minimis post anthesin 12 lin. longis; peranthodii foliolis oblongo-linearibus 8 flosculos subaequantibus. Fructibus a basi muriculatis, breviter rostratis; rostro glabro striato apice incrassato duplo longioribus; pappo fructibus cum rostro dimidio breviore. Flosculis citrinis. (Affinis *T. brevirostri* DC. et *matabili* Jacq. esse videtur!) — Auf der Bruckenthalwiese rechts vor den drei Eichen bei Hermannstadt ein paar Exemplare mit 10—12 Stengeln aus einer Wurzel 1850—1853 beobachtet. Jul. Aug.

2046. *T. major* Jacq. A. t. 29. — Bmg. 1614. — Auf Hügeln, an Weinbergen, Wiesen, grasigen Abhängen, an Wegen und Aeckern Jun. Jul.

2047. *T. undulatus* Jacq. icon. rar. t. 158. — Bmg. 1613. — Ledeb. Ross. 2, 786. — (*T. orientalis* Pall. [non L.] — *T. villosus* M. Bieb.) — Auf Wiesen in Obst- und Grasgärten bei Hermannstadt, Kronstadt. Jun. Jul.

2048. *T. orientalis* L. sp. 1109. — Koch syn. ed. 2, 486. — Schur Sert. n. 1672. — (*T. undulatus* Rchb. exc. germ. p. 277 [non Jacq.] — *T. revolutus* Schweig. Hagen Chlor. bor. p. 288. — *T. undulatus* β *orientalis* DC. — *T. pratensis* Fl. dan. t. 906.) — Auf Wiesen bei Hermannstadt, häufiger als die nächstfolgende Art. Jun. Aug.