

Page 41 (*Galium Hercynium* γ . *riparium*), ligne 23, après Maromme (Rouy), ajouter : **Finistère** : lande à Lopérec (Guffroy);

Page 60 (*Asperula Cynanchica* ι . *pseudo-tinctoria*), ligne 28, après (Rouy), ajouter : **Cher** : Crésançay (Lambert).

Page 112, au renvoi, au lieu de Bellecourbe, lire : Bellecombe.

Page 137 (*Solidago rupicola*), ligne 2, après (Rouy), ajouter : Le Diben et Primel (Guffroy),

TOME IX

Page 226 (*Crepis aurea*), ligne 3, ajouter : hautes Vosges : Rothenbach (Lemasson); spontané ?

Page 257 (*Hieracium pedunculatum* γ . *pilosellium*), ligne 24, après **Alsace**, ajouter : **Meuse** : Pagny-sur-Meuse (Breton).

Page 327 (*Hieracium chalybæum*), ligne 2, après (Sudre), ajouter : **Alsace** : rochers autour du Lac Blanc (sec. Lemasson).

Page 391 (*Hieracium virgultorum* β . β . *Vasconicum*), ligne 7 en remontant, avant **Marne**, ajouter : **Vosges**.

Page 462 (\times *Saxifraga Gaudini*), ligne 17 en remontant, après (Neyraut in h. R.), ajouter : rochers à Héas (Coste et Soulié).

TOME X

Page 6 (*Tragopogon*), entre les lignes 15 et 16, intercaler :

Hybride. — **T. Lacaitæ** Rouy; *T. dubius* \times *crocifolius* ej. — Port et feuilles du *T. crocifolius* L., dont il se distingue par : Pédoncules visiblement mais brièvement claviformes-fistuleux (3 1/2 mill. de diam. sous la calathide); péricline à 8 folioles un peu plus courtes que les fleurs, les folioles int. du péricline bordées de noir; ligules toutes jaunes int., rougeâtres sur la face ext. seulement (et non purpurines sur les 2 pages).

HAB. — **Hautes-Alpes** : col de Glaise près Gap, près de quelques pieds de *T. dubius* et non loin de nombreux pieds de *T. crocifolius*, alt. 1700 m., 27 juin 1911 (*Lacaita* in herb. Rouy).

Page 127 (*Plantago alpina*), ligne 13, ajouter : **Alsace** : hautes Vosges : sous les remparts de Rheinkopf (Lemasson); spontané ?

Page 376 (*Saxifraga cervicornis*), entre les lignes 16 et 17, ajouter :

Obs. II. — A l'appui de l'observation précédente, il convient d'ajouter que j'ai récolté, dans les Alpes-Maritimes, le *S. Pedemontana* All. et, en Corse, le *S. cervicornis* Viv., lequel m'a paru véritablement très distinct du premier. — Disons aussi que cette manière de voir a été, dès 1884, exprimée par M. William Barbey dans les termes suivants (*Floræ Sardæ compendium*, p. 226) : « **S. cervicornis** Viv. — C'est une belle et bonne espèce. Nous avons cultivé à Valleyres le *S. cervicornis* à côté du *S. pedemontana* All. dont il est *toto cælo* différent. — W. B. »

TOME XI

Page 24 (\times *Verbascum seminigrum*), ligne 6 en remontant, après **Orne**, ajouter : **Meuse**.