

*rales lancéolées*, aiguës, plus ou moins *raides*, *étalées-dressées* ou dressées, à peine ou *de moitié plus longues que le capitule* florifère petit (5-12 millimètres de diamètre); *écaille des calathides à acumen argenté ou blanchâtre*; *plante grêle, naine* (5-20 millimètres).

J'ajouterai que ma variété *castellana* est intermédiaire entre les variétés *carpetana* et *gallica*; elle présente: *Feuilles florales molles, oblongues*, obtusiuscules-mucronées ou aiguës, *rayonnantes*, à peine *du double plus longues que le capitule* florifère de *grandeur moyenne* (10-28 millimètres de diamètre); *écailles des calathides plus ou moins velues extérieurement, à acumen d'un blanc jaunâtre*. Plante de 20 à 45 millimètres.

Vous pouvez constater les caractères de ces trois variétés sur les exemplaires que je communique à la Société et qui ont été récoltés :

La variété *gallica* à Sèche-Bec ;

La variété *castellana* dans les provinces de Madrid, Badajoz, Cordoue et Cadix, en Espagne, et dans l'Alemtejo méridional, en Portugal ;

La variété *carpetana* à l'Escorial, au « pinar » de Guadarrama, dans la province de Palencia, en Espagne, et dans l'Alemtejo central, en Portugal.

Vous remarquerez, aussi que, parmi ces exemplaires, se trouvent l'*Evax carpetana* récolté par M. Lange, le créateur de l'espèce, et le *Filago pygmæa* Cav. (var. *castellana* Nob. de l'*E. Cavanillesii*) recueilli en 1804 par Lagasca et en 1883 par moi à la localité classique de Cavanilles : *la Casa de Campo*.

V. × TRAGOPOGON MIRABILIS Rouy (= *T. porrifolius* × *pratensis*).

Cet hybride paraît avoir été trouvé pour la première fois par M. Gosselman, puis par M. Lubeck, aux environs de Carlskrona (Blekinge, Suède), sous la forme *T. porrifolio-pratensis* Gosselm. MM. Foucaud, Termonia et Maire l'ont constaté en France, d'abord dans la prairie de Rhosne, près Rochefort-sur-Mer (Foucaud), à Saint-Laurent de la Prée (Foucaud et Termonia), à Angoulins et à Andilly (Maire), sous cette même forme, en compagnie des parents. M. Foucaud a recueilli également le *T. mirabilis* var. *minor* Nob., produit par le croisement du *T. minor* Fries (*T. pratensis* L. var.) avec le *T. porrifolius* L.

Ces Salsifis sont caractérisés par les *pédoncules renflés en massue* au sommet, les fleurs à *ligule rouge vineux dans la moitié supérieure, mais jaune à la base*, les *feuilles longuement acuminées* et dilatées à la base, les *achaines fortement tuberculeux-scabres à bec* aussi long qu'eux et *pourvu de quelques tubercules*, enfin par l'*aigrette fauve*. — Dans la variété *minor*, les ligules sont d'un tiers au moins plus courtes que les folioles du péricline.