

re *Hieracii incarnati*. CALYX dupli ordine sepalorum, exterioribus di-
midio brevioribus subscariosis laxiusculis ovato-lanceolatis glabris, in-
terioribus lanceolatis, linea media hispida notatis, maturitate costatis.
COROLLULAE omnes hermaphroditae ligulatae 4-5-dentatae. PAPPUS simplex
stipitatus sordide albus. SEMINA linearia. RECEPTACULUM nudum.

Hab. in agro Sibenicensi: misit etiam ex agro Traguriensi D. Andreas
Andrich. Floret vere. (v. s. spont.)

Obs. Variat caulis simplicibus ramosisque, foliorum lobis integris
et incisis. Differt a *Crepide rubra* L. praesertim foliis magis laciniatis,
pinnatifido-runcinatis; nec lyratis, et caulis adscendentibus ramosis.

Huiusce stirpis specimen monstruosum possideo morbo illo laborans
quem cl. RE *platesiae* nomine designavit, caule scilicet admodum com-
presso et dilatato, arcuato anguloso striato nitido, apice latiore flori-
bus sessilibus congestis praedito, ramis secundis flexuosis unifloris or-
nato, foliisque tenuius dissectis.

X.

GENUS II.

TRICHOCREPIS.

CH. GEN. ESSENT. CALYX calyculatus squamis laxiusculis. RECEPTA-
CULUM pilosum. PAPPUS simplex sessilis.

CH. GEN. NATUR. CALYX dupli ordine squamarum, basi villoso-ca-
nescens: squamae exteriore, sive calyculi, minimae lanceolatae albo mar-
ginatae erectae laxiusculae (6-8); interiores quadruplo et ultra lon-
giores lineares marginatae, carina hispidae, semine decidente reflexae.
(12 circ.)

COROLLULAE omnes ligulatae, apice acute 5-dentatae, basi tu-
bulosae, calycem superantes, hermaphroditae, fertiles (luteae).

ANTHERAE quinque in tubum connexae.

PISTILLUM tubo antherarum longius, in duo stigmata globulosa
bifidum.

PAPPUS sessilis simplex, pilis tenuissimis candidis compositus.

SEMEN lineare striatum sessile (badium).

RECEPTACULUM planum, punctatum, pilis capillaribus, sordide
albis, persistentibus, calycem aequantibus, et seminibus interpositis, praedi-
tum.