

SPECIES.

TRICHOCREPIS BIFIDA. Tab. VII.

CH. NATUR. SP. Herba annua spithamaea caespitosa. RADIX perpendicularis ramosa gracilis. FOLIA omnia radicalia, breviter hirta, lyrato-runcinata, pinnatifida, lobis deflexis integris angulatisve acutiusculis, terminali majore subovato angulato obtuso. SCAPI seu pedunculi radicales nudi filiformes elongati glabriusculi adscendentes (rubelli) apice saepius bifidi, ramulis divaricatis, quorum altero simplici, altero non raro bifurco. BRACTEAE minimae ad scapi divisionem positae, marginatae, lanceolato-subulatae. FLORES lutei solitarii terminales nutantes. ☉

Hab. in agrō Sibenicensi. Vere (v. s. spont.)

OBS. Herba habitu *Crepidis*, a cujus genere nec non ab omnibus in Syngenesia aequali contentis differt receptaculo piloso, qui character in floribus calyculatis hujusce ordinis nusquam occurrit. Nomen genericum e characterē receptaculi et habitu plantae composui, scilicet a *τριχὸς crinis*, et *Crepis*, genus affine, quasi diceret, *Crepis crinita*, cum pili receptaculi capillos seu crines aemulentur.

XI.

CL. XIX. ORD. II. Polygamia superflua LINN. *Syst. sex.*

CL. X. ORD. III. Corymbiferae SECT. III. JUSS. *Gen. pl. p.* 183.

CL. III. ORD. I. Corymbiferae DE C. *Th. elem. p.* 216.

GENUS.

CHRYSANTHEMUM Linn. *Gen. n.* 966. Pers. *Syn. pl. gen. n.* 1879.
PYRETHRUM Willd. *Sp. pl. gen. n.* 1511.

SPECIES.

CHRYSANTHEMUM TURREANUM. Tab. VIII.

CH. ESSENT. C. sericeum, caule flexuoso ramoso herbaceo; pedunculis elongatis nudiusculis unifloris; foliis inferioribus bipinnatifidis rigidis, pinnis bifidis: mediis pinnatifidis: supremis lineari-lanceolatis integris; pappo eroso. 2.

SYN. *Matricaria Bellidis amplo flore Jacobae cinerariae folio*. Georg. a Turre *Cat. Plant. Hort. Patav.* 1660. p. 63.

Chrysanthemum exoticum incano Cinerariae folio. Bocc. *Mus. pl.*



Trichocephalus bifida