

DE  
**PLANTIS IN EXPEDITIONE ROMAN-  
 ZOFFIANA**

OBSERVATIS DISSERERE PERGITUR.

*SYNANTHEREAE ADDENDAE.*

AUCTORE CHR. FR. LESSING.

*Cichoraceae* (p. 98).

TROXIMON Gaertn.

Troximon *apargioides* n. sp.

Cel. de Chamisso in California (v. sp. s. plura).

Facies *Krigiae virginicae* vel etiam *Apargiae autumnalis monocephalae*. Rhizoma multiceps, pennam corvinam crassum, apice rosulas foliorum protrudens, caulibus uno pluribusve simplicissimis, glabris, monocephalis, apice haud incrassatis intermixtis. Folia glabra, anguste linearilanceolata, integerrima — pinnatifida, laciniis semilanceolatis, remotis, divergentibus, longe, saepe longissime petiolata, petiolis basi dilatatis adjectis 3 — 6'' longa,  $\frac{1}{2}$  —  $1\frac{1}{2}$ ''' lata. Involucrum floribus brevius, multiseriale, foliolis obtusiusculis, planis, margine scariosis, plerisque extus hirsutis. Rhachis plana, nuda. Ovaria glabra, rostrata, multicostata. Corollae luteae, lingulis tubum pilosiusculum excedentibus. Antherae caudatae, caudis integris, filamentum articulum superiorem excedentibus, alis minutis, rotundo ellipticis, obtusis. Stylus ut in tribu. Pappus caducus, pluri-serialis, capillaris, minute serrulatus, albus.

*Obs.* Quamquam *Troximon* perscrutari adhuc mihi non licuerit, attamen huic generi plantam adnumeravi. *Tragopogon fritillarioides* Linn. VI. 101 est congener, sed *Tragopogon* differt tantummodo pappo corneo-setaceo. Secundum cl. Don recedit *Picrosia* a *Troximone* alis antherarum rotundo-ellipticis nec oblongo-ellipticis.

*Asteroidaeae* (p. 188).

Subtrib. *Astereae*.

SOLIDAGO L. \*)

11. SOLIDAGO *petiolaris* Ait. W. sp. pl. III. n. 2062.  
Ej. hrb. n. 15965.

In California legit cel. de Chamisso.

12. SOLIDAGO *lanceolata* Ait. W. sp. pl. III. n. 2062.  
Ej. hrb. n. 15967. *Chrysocoma graminifolia* L.

Cum praecedente.

13. SOLIDAGO *stricta* W. sp. l. c. Ej. hrb. n. 15966.  
Ait. h. kew. ed. 2. V. p. 68.

Cum praecedentibus.

14. SOLIDAGO *puberula* Nutt. North. Am. pl. II. p. 162  
(secundum descript.).

Cum praecedentibus.

ERIGERON.

(Linnaea V. 145. VI. 126.)

3. ERIGERON *lepidotus* n. sp.

Ill. de Chamisso in O. Wahu (v. sp. s. ∞).

*Conyzae albae* similis. Fruticulus ramis adgregatis, teretibus, atrofuscis, striatis, adultis aphyllis foliorumque lapsu tuberculatis, junioribus usque ad apices dense foliatis. Folia sparsa, sessilia, linearia, acuta, basin versus an-

\*) Subgenus *Asteris*