

Le receptacle est nud à sa superficie & pointillé.

La Willemetie doit être classée parmi les Semiflosculeuses, de la Singénésie poligamie-égale, à côté des Hiéracions, qui est la 19<sup>e</sup> classe de la méthode sexuelle du Chevalier de Linné. Il n'y a que l'espèce suivante connue, qui doit entrer dans ce genre.

## *WILLEMETIA HIERACIOIDES*

DE NECKER.

### DESCRIPTION.

La tige haute d'un pied & demi, ronde, fistuleuse, légèrement striée, un peu hérissée vers le sommet, quelquefois pourvue d'une foliole, portant environ quatre fleurs jaunes, à péduncules inégaux.

Les feuilles ovales-oblongues, pétiolées, amincies à leur base, pointues à leur sommet, pâles en-dessous, d'un beau verd en-dessus, lisses des deux côtés, légèrement dentelées au bord.

Le calice oblong, garni & couvert en haut, de poils noirs, ferrés.

La fleur est jaune, composée de segmens linéaires, lancéolés, recourbés.

La bractée lancéolée, en lacet, sessile, presque entière, située chaque fois à la base des péduncules.

La semence mûre est oblongue, brune, armée en forme de chaussetrape.

La fructification terminale.

Cette plante a été trouvée en Autriche.

M. Jacquin, Professeur de Botanique à Vienne, dans le troisième volume de sa Flore d'Autriche, figure 293, la dénomme *Hieracium stipitatum*.

