

Libano legit ei. Ancher pl. exs. n. 3459! Radix longa teres. Scapi subincurvi circ. 2-3-pollie. Flores flavi. Rostrum breve. Species ex habitu ad *T. obovatum* paululùm accedit. (v. s. comm. à cl. inv.)

† Species non satis nota.

30. *T.?* *SEIKENEX*, foliis radicalibus glabris in orbem expansis oblongis apice rotundatis inferiùs emarginatis, scapis 1-cephalis longis, invol. squamis subherectis apice reflexis. (1) in Chinâ. *Leontodon Sinesense* Lour. fl. coch. 2. p. 584. Ex pappo piloso potius ad *Taraxacum* accedere videtur.

†† Species exclusæ.

*T. CAULESCENS* Mor. = *Macrohynchus pterocarpus*.

*T. SULCOSUM* Reichb. = *Ætheorhiza bulbosa*.

*T. PUMILUM* Gaud. = *Macrohynchus pumilus*.

*T. SAXATILE* Booc. = *Hyoeris radiata*.

DCCCXXII. *WILLEMETIA* Nees. *elem. (1790) 1. p. 50. Cass. diet. 48. p. 427. Less. syn. 136. non Märckl. nec Brongn. (1). — Wilbelia Ruhl. germ. 2. p. 426. Tausch in florâ 1828. organ. p. 81. — Calycococcus Schmidt phys. oek. austr. 1. p. 271. — Aspidelium Zollik. in litt. 1817. — Peltidium Zollik. nat. avz. 1820. aug. — Zollikoferia Nees in Bluff et Finger. comp. 2. p. 305. non DC.*

Capitulum multiflorum. Invol. squamis 10-12 uniserialibus et squamellis accessoriis paucis constans. Recept. planum nudum. Achænium subpentagonum exalatum costis apice in tubercula dentiformia productis; rostrum inter tubercula ex apice achæniî ortum gracile achænio longius. Pappus 1-serialis pilosus. — Herbar pcrenes, rhizomate crassiusculo, *Leontodontis* facie, erectum, simplices aut parcè ramosas aphyllæ. Folia radicalia oblongo-obovata dentata membranacea. Capitula lutea ad caulis aut ramorum apices solitaria. — Genus ex caract. fructûs *Taraxaco*, ex habitu *Barkhausiæ* seu *Leontodonti* affine.

1. *W. SPARGIOIDES* (Less. syn. 136), foliis radicalibus dentatis, scapo polycephalo apice præsertim involucrique nigro-pilosis. (1) in sylvis alpinis et subalpinis Austriæ (Jacq.), Carinthiæ (Hopp!), Salisburgi, Bavaris (Pers.), Helvetiæ orientalis (Zoll! Moritz!) et in Pyrenæis ad montem Llaurenti (Thom!). *Hieracium stipitatum* Jacq. fl. austr. 1. 293. *Crepis spargioides* Willd. 1. p. 3. p. 156. *Crepis Spargia* Pers. ench. 2. p. 375. *Wilbelia spargioides* Ruhl. deutschl. fl. 2. p. 426. *Peltidium spargioides* Zoll! l. c. *Zollikoferia hieracioides* Nees l. c. *Chondrilla Peltidium* Moritz fl. schw. p. 361. *Barkhausia spargioides* Duby! ench. 1. p. 298. Spreng. syst. 3. p. 652. *Hieracium intermedium* Hoppe! olim in pl. exs. *Zollikoferia Peltidium* Gaud. fl. belv. 5. p. 143. (v. s.)

2. *W. TURBOSA* (Fisch! et Mey. in litt. 1836), foliis radicalibus lyratis, scapo 1-cephalo glabro. (1) in sylvaticis propè Lenkovan ad mare Caspium legit rev. Hohenacker. Herba glaberrima excepto invol. basi villosa. Scapus omninò aphyllus foliis multò longior. Folia subtus glauca, lobo terminali maximo ovato subcordato donata. Fruct. non vidi. (v. s. comm. à cl. auct.)

(1) *Willemetia Märckl.* (1800) seu *Villemetia Moq.* est *Echinopsilon*. — *Willemetia Brongn.* (1817) est *Ceanothis sertio* nostra *Sarcocauloides*, fortè nomine generico *sluttata*, Conf. *Soyer-Will.* in ann. sc. nat. 1834. v. 2. p. 135.