

Pappus albus tenuis subuniserialis. (v. s. comm. ab hon. coet. merc. angl. Ind. or.)

4. *Y. NAPIFOLIA*, glabra basi subhirsuta, caule erecto tereti apice laxè paniculato subaphyllo, foliis radicalibus et caulinis inferioribus petiolatis runcinato-lyratis, lobis ovali-oblongis obtusè sinuatis mucronato-denticulatis, ultimis confluentibus, invol. 8-phylo minutissimè calyculato, achæniis apice attenuatis. (I) in Silhet Indiæ orient. *Prenanthes napifolia* Wall.! cat. comp. n. 387. *Lactuca napifolia* DC. in Wight contr. p. 27. Ex achænio apice magis acuminato ferè ad *Lactucæ* sect. *Mycelium* accedit. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)

5. *Y. POOSIA*, caule teretiusculo apice paniculato [glabro aut minutissimè pubescente, foliis caulinis pinnatipartito-lyratis in petiolum attenuatis, lobis obtusis, terminali subacuminato, invol. 8-phylo minutè calyculato 10-12-floro, achæniis striatis subtrigonis vix apice attenuatis, (I) in Indiâ orientali loco dicto Bahwanigung sen Bhawanigungj decemb. flor. legit cl. Hamilton. *Prenanthes Poasia* Ham.! herb. *Prenanthes Poasia* Wall.! cat. n. 3265. comp. n. 375. (v. s. in herb. hon. cur. merc. angl. Ind. or.)

6. *Y. STRIATA*, caule basi pubescente cæterùm glabro striato subnudo apice paniculato, foliis inferioribus petiolatis lyrato-pinnatifidis, lobis ovatis mucronatis denticulatis, summis paucis sessilibus lineari-lanceolatis, invol. 8-phylo minutè calyculato 10-12-floro, achæniis striatis subtrigonis utrinque subattenuatis. (I) in insulâ Javâ, ad ortum flum. Tjimahie montis Burangrang. *Prenanthes striata* Blume! bijdr. p. 835. Herba pedalis nudiuscula. Folia subradicalia 3-3 $\frac{1}{2}$ poll. longa, secus nervum puberula. (v. s. comm. à cl. Blume.)

7. *Y. AMBIGUA*, caule angulato striato subnudo apice paniculato basi pubescentes foliis radicalibus pilosiusculis petiolatis runcinato-pinnatipartitis, lobis triangularibus mucronato-dentatis, terminali vix majore, caulinis paucis sessilibus glabris, invol. 8-phylo minutissimè calyculato, achæniis subtrigonis striatis apice attenuatis. — in Indiæ orient. prov. boreali-occid. leger. cl. Wallich et Royle. Affinis *Y. striatæ*. (v. s. comm. à cl. inv.)

8. *Y. FASTIGIATA*, caule tenui subnudo apice subcorymboso, foliis inferioribus petiolatis lyrato-runcinatis, lobis ovatis mucronato-dentatis, terminali multò majore, summis subsessilibus sinuatis acuminatis, invol. 8-phylo minutè calyculato 10-12-floro, achæniis subtrigonis striatis vix apice attenuatis. (I) in graminosis humidis insulæ Javæ circâ Buitenzorg. *Prenanthes fastigiata* Blume! bijdr. p. 836. Herba infernè foliosa pubescens, supernè nuda glabra. Folia inf. 3 poll. longa, pollicem lata, membranacea. (v. s. comm. à cl. Blume.)

† *Species non satis notæ.*

9. *Y.?* *PROCUMBENS*, glabra, caulibus procumbentibus dichotomis, foliis plerisque radicalibus, linearibus runcinatis, lobis brevibus obtusis, racemis terminalibus, capitulis remotè fasciculatis. — in Bengalo. *Prenanthes procumbens* Roxb. fl. ind. 2. p. 404. Flores flavi 20-30 in invol. cylindrico.

10. *Y.?* *ACAULIS*, glabra, caulibus è collo plurimis scaposis 4-5-céphalis foliis brevioribus, foliis radicalibus sessilibus lineari-lanceolatis integris lævibus, invol. 8-floris. \mathcal{L} in Bengali interioris distr. Dinageporo. *Prenanthes acaulis* Roxb. fl. ind. 3. p. 403. Flores flavi. Invol. 6-8-phyllum squamis 3-4 calyculatam.

11. *Y. LANCEOLATA*, glabra, caule adscendente striato, foliis infer. petiolatis ovato-oblongis obtusis integerrimis margine revolutis, super. amplexicaulibus, paniculâ coarctatâ. (I) in Japoniâ. *Prenanthes lanceolata* Houtt. pfl. syst. 9. p. 49. t. 66. f. 2. Willd. sp. 3. p. 1534. *Prenanthes integra* Thunb. fl. jap. 300. *Chondrilla lanceolata* Poir. suppl. 2. p. 329. Cor. lutea (Th.), in capitulo duodenæ. (Houtt.)

12. *Y. DENTATA*, glabra, caule erecto striato paniculato, foliis radicalibus oblongis cum acumine dentatis, caulinis amplexicaulibus ovatis acutis, paniculâ