

Pappus albus tenuis subuniserialis. (v. s. comm. ab hon. cœt. merc. angl. Ind. or.)

4. Y. NAPIFOLIA, glabra basi subhirsuta, caule erecto tereti apice laxè paniculato subaphyllo, foliis radicalibus et caulinis inferioribus petiolatis runcinato-lyratis, lobis ovali-oblongis obtusè sinuatis mucronato-denticulatis, ultimis confluentibus, invol. 8-phyllo minutissimè calyculato, achænijs apice attenuatis. (I) in Silhet Indiæ orient. Prenanthes napifolia Wall. cat. comp. n. 387. Lactuca napifolia DC. in Wight contr. p. 27. Ex achænio apice magis acuminato ferè ad Lactucae sect. Mycelim. accedit. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)
5. Y. POOSIA, caule teretiusculo apice paniculato [glabro aut minutissimè pubescente, foliis caulinis pinnatipartito-lyratis in petiolum attenuatis, lobis obtusis, terminali subacuminato, invol. 8-phyllo minute calyculato 10-12-floro, achænijs striatis subtrigonis vix apice attenuatis, (I) in Indiâ orientali loco dicto Bahwanigung seu Bhawanigunj decemb. flor. legit cl. Hamilton. Prenanthes Paosia Ham. herb. Prenanthes Poosia Wall. cat. n. 3265. comp. n. 375. (v. s. in herb. hon. cur. merc. angl. Ind. or.)
6. Y. STRIATA, caule basi pubescente cæterùm glabro striato subnudo apice paniculato, foliis inferioribus petiolatis lyrato-pinnatifidis, lobis ovatis mucronatis denticulatis, summis paucis sessilibus linear-lanceolatis, invol. 8-phyllo minutè calyculato 10-12-floro, achænijs striatis subtrigonis utrinque subattenuatis. (I) in insnlâ Javâ, ad ortum flum. Tjimahie montis Burangrang. Prenanthes striata Blume! bijdr. p. 835. Herba pedalis nudiuscula. Folia subradicalia 3-3 $\frac{1}{2}$ poll. longa, secùs nervem puberula. (v. s. comm. à cl. Blume.)
7. Y. AMBIGUA, caule angulato striato subnudo apice paniculato basi pubescentes foliis radicalibus pilosiusculis petiolatis runcinato-pinnatipartitis, lobis triangularibus mucronato-dentatis, terminali vix majore, caulinis paucis sessilibus glabris, invol. 8-phyllo minutissimè calyculato, achænijs subtrigonis striatis apice attenuatis. — in Indiæ orient. prov. boreali-occid. leger, cl. Wallich et Royle. Affinis Y. striatae. (v. s. comm. à cl. inv.)
8. Y. FASTIGIATA, caule tenui subnudo apice subcorymboso, foliis inferioribus petiolatis lyrato-runcinatis, lobis ovatis mucronato-dentatis, terminali multò majore, summis subsessilibus sinuatis acuminatis, invol. 8-phyllo minute calyculato 10-12-floro, achænijs subtrigonis striatis vix apice attenuatis. (I) in graminosis humidis insulæ Javæ circè Buitenzorg. Prenanthes fastigiata Blume! bijdr. p. 836. Herba infernè foliosa pubescens, supernè nuda glabra. Folia inf. 3 poll. longa, pollicem lata, membranacea. (v. s. comm. à cl. Blume.)

† Species non satis notæ.

9. Y.? PROCUMBENS, glabra, caulinis procumbentibus dichotomis, foliis plerisque radicalibus, linearibus runcinatis, lobis brevibus obtusis, racemis terminalibus, capitulis remotè fasciculatis. — in Bengalo. Prenanthes procumbens Roxb. fl. ind. 2. p. 404. Flores flavi 20-30 in invol. cylindrico.
10. Y.? ACAULIS, glabra, caulinis è collo plurimis scaposis 4-5-céphalis foliis breviribibus, foliis radicalibus sessilibus linear-lanceolatis integris lævibus, invol. 8-floris. 2/ in Bengali interioris distr. Dimageporo. Prenanthes acanlis Roxb. fl. ind. 3. p. 403. Flores flavi. Invol. 6-8-phyllo squamis 3-4 calyculatam.
11. Y. LANCEOLATA, glabra, caule adscendente striato, foliis infer. petiolatis obovato-oblongis obtusis integerrimis margine revolutis, super. amplexicaulibus, paniculâ coarctatâ. (I) in Japoniâ. Prenanthes lanceolata Houtt. pfl. syst. 9. p. 49. t. 66. f. 2. Willd. sp. 3. p. 1534. Prenanthes integra Thumb. fl. jap. 300. Chondrilla lanceolata Poir. suppl. 2. p. 329. Cor. luteæ (Th.), in capitulo duodenæ. (Houtt.)
12. Y. DENTATA, glabra, caule erecto striato paniculato, foliis radicalibus oblongis cum acumine dentatis, caulinis amplexicaulibus ovatis aequali, paniculæ