

Los señores Bentham i Hooker reunen las *Zollikoferias* con el género *Microrrychus* de Lessing. (Genero plant. II, p. 529).

ZOLLIKOFERIA? ELQUIENSIS.—Ph.

Z? annua, glaberrima, caule erecto; foliis oblongis, grosse et paucidentatis, radicalibus in petiolum attenuatis, caulinis basi lata amplexicaulibus; ramis monocephalis, uni-vel bifoliatis; squamis involucri centro viridibus, margine late scariosis.

Prope oppidum Elqui, jam Vicuña dicti, Octobre 1878 inveni.

La planta tenia solo la altura de 20 centímetros, pero será probablemente mayor en años ménos secos, i llevaba, a lo mas, cinco cabezuelas. La raíz es blanca i mui sencilla. Las hojas radicales estaban ya casi todas marchitadas i caidas; las tallinas inferiores mas grandes tienen 25 milímetros de largo i 5 milímetros de ancho, las superiores tienen la misma longitud, pero su anchura es la doble i triple; son puntiagudas, i llevan de cada lado unos tres dientes grandes. Las cabezuelas tienen el largo de 9 milímetros i el mismo diámetro; sus escamas son multiseriadas, todas escariosas en los lados, las exteriores mas i mas cortas i al fin reflejas. Las corolas mui delgadas, tienen el tubo largo. Los aquenios son sin pico, algo comprimidos, con muchas costillas, mui lisas, que rematan en un dientecito; el vilano es de un blanco de nieve, mui caduco, con pelos mui blandos. —¿A qué género debe referirse? ¿debe acaso constituir un género especial? Se distingue de la *Zollikoferia* típica, *Z. chondrilloides*, por los aquenios multicostatos i a quienes faltan los cuatro pequeños cuernecitos de la base. No puede pertenecer al género *Microrrhynchus* Less., con el cual Bentham i Hooker quieren reunir las *Zollikoferias* de De Candolle, a pesar de que éstas tienen los aquenios subtiliter estriados, i los *Microrrhynchos* aquenios "4-5 costatos".

VII. *Crepis* L.

"Capitulum multiflorum, involucri duplex, interius uniseriale, exterius breve calyculiforme. Receptaculum epaleaceum, Achaenia terrestriuscula, exalata, sensim in rostrum breve atte-