

Zollikoferia granatensis.

(AMO. MSS.)

Char. specif., Caulibus simplicibus, scapiformibus, ferè nudis. Foliis hirsuto-lanuginosis, inæqualiter dentato-sinuatis subruncinatis, lobo terminali acuto cæteris majore. Antodiis primùm cernuis, dein erectis, hirsuto-lanuginosis, squamis triseriatis, subimbricatis, exterioribus minoribus patulis, sed non reflexis. 4 Hab. in herbosis regionis montanæ *Sierra-Nevada* prope *el cortijo de San Gerónimo*. Florebat die 2 Julii anni 1856 in quo eam legi.

Descriptio. Radix simplex fibrosa, perpendicularis, sublignosa, extùs nigricans, intùs fulva, collo reliquiis foliorum vetustorum densè imbricatis onusta, ex quo centro folia nova rosulata caulesque (1-5) scapiformes prodeunt. Folia radicalia hirsuto-lanuginosa, 3-5 pollic. longa, 6-10 lin. lata, inæqualiter dentato-sinuata, subruncinata, lobo terminali acuto. Folium caulinum unicum, raro 2, lineare, basi dilatatum semiamplexicaule 5-6 lin. longum; dùm 2 folia adsint, inferius quoque lineare, quamvis 5-4-plò longius, et integrum. Caules 2-5, raro 1, scapiformes, monocephali, in anthesis initio breviores, denique elongati, 5-8-pollicares, striato-sulcati, basi et apice densè hirsuto-lanuginosi, cæterùm glabriusculi. Anthodium primùm cernuum, denique sub anthesi erectum, cylindræum, squamis pluribus triseriatis, lanceolatis, hirsuto-lanuginosis constans. Squamæ omnes margine membranacea flavescentes, dorso virides; exteriores interioribus 3-plò breviores, patulæ; reliquæ erectæ adpressæ; intermediae exterioribus subduplò longiores. Ligulæ luteæ, oblongæ; apice truncatæ 5-dentatæ, squamis interioribus anthodii longiores. Akenia (immatura) brunnea, linearia, subcompressa, lævia, striatula, basi et apice truncata et parùm attenuata, non rostrata. Pappus akeniis duplò longior, albus, pilosus, conformis, multiseriatis, pilis lævibus capillari-bus, basi liberis, sessilis. Receptaculum nudum.

Obs. Esta nueva especie tiene la *facies* de un *Taraxacum*, pero los caractères enunciados la colocan en el género *Zollikoferia* de De-Candolle; y es fácil distinguirla de la *Zollikoferia pumila* del mismo autor, ó sea la *Scorzonera pumila* de Cavanilles, Icon. pl., tom. II tab. 421, fig. 2.—*Sonchus scorzoneraefolius* de Lagasca y Dufour, que crece en Navarra, Valencia y Murcia: puesto que esta última tiene los tallos ramosos desde la base, y las ramas terminadas por una calatida, lampiños como las hojas; las cuales son pinado-hendidadas en lacinias lineares, que llevan solamente en la costilla y en el ápice de las particiones algunas cerdas.