

- Tragopogon Palaestinum* Boiss. — Boiss., Fl. Or., III, p. 751. Libanon: Sannin, in subalpiner Lage, bei 1600—1800 m, sehr verbreitet (exs. Nr. 977).
- Scorzonera Jacquiniiana* (Koch) *γ. subintegra* Boiss. — Boiss., Fl. Or., III, p. 757. Antilibanon: Auf der Spitze des Hermon, 2600—2800 m (exs. Nr. 980), daselbst auch Exemplare mit stets völlig ganzrandigen Blättern (var. *integerrima*, exs. Nr. 980 b).
- Scorzonera mollis* M. B. *β. longifolia* Boiss. — Boiss., Fl. Or., III, p. 762. Galiläa: Bei Safed, am Dschebel Zebüd (exs. Nr. 978); neu für Palästina.
- ? *Scorzonera phaeopappa* Boiss. — Boiss., Fl. Or., III, p. 764. Antilibanon: Bei Rascheya (exs. Nr. 978); der Pappus der reifen Achenen ist zwar schwarzbraun (*pappo fuliginoso non sordide albo*), indessen nur 7 (nicht 8—12) Linien lang.
- Scorzonera papposa* DC. — Boiss., Fl. Or., III, p. 765. Palästina: Im Küstengebiet ebenfalls recht häufig, so bei Jaffa (exs. Nr. 982).
- Sonchus Nymani* Tineo (= *S. glaucescens* Jord. — Boiss., Fl. Or., III, p. 796). Libanon: Am Sannin noch bei 1750 m (exs. Nr. 948); vgl. Haussknecht in Symbol. ad fl. Graec. in Mitth. d. thür. bot. Ver., N. F., Heft VIII (1895), S. 48.
- Lactuca Cretica* Dsf. var. *violacea* Bornm. (var. nov.). — Cfr. Boiss., Fl. Or., III, p. 805.
- Floribus violaceis nec ut in typo luteis.*
- Libanon: Bei Brummana (exs. Nr. 949). Palästina: Am Carmel (exs. Nr. 950); trotz der röthlich violetten Blüthen gehört die Pflanze bestimmt zu *L. Cretica* Dsf., mit der sie in der Samenbeschaffenheit völlig übereinstimmt, und nicht zu *L. tuberosa* (L.).
- Zollikoferia nudicaulis* (L.). — Boiss., Fl. Or., III, p. 824. Judäa: An den westlich von Jericho gelegenen felsigen Abhängen recht häufig (exs. Nr. 951, f. *microcephala*); von Post (l. c., p. 490) nur vom Sinai angegeben, indessen bei Jericho schon von Kersten (Boiss., l. c., Suppl., p. 323) gesammelt.
- Zollikoferia mucronata* Forsk. — Boiss., Fl. Or., III, p. 822. Jaffa: In den Sanddünen häufig (exs. Nr. 984), besonders gegen Saronia hin. Sie weicht von der egyptischen und persischen Pflanze, ebenso von der in Jaub. et Spach (III., Tab. 279!) gegebenen Abbildung durch breitere, spitzere, weniger getheilte Blattabschnitte (var. *latisecta* Bornm. exs.) ab, sowie durch grössere Köpfe, ist aber weder mit *Z. Arabica* Boiss., welche seidig behaarte Achenen besitzt, noch mit *Z. Cassiniana* Jaub. et Spach mit spitzeren, nicht berandeten Hüllblättern zu vereinen.
- Crepis robertioides* Boiss. — Boiss., Fl. Or., III, p. 840. Libanon: Sannin, an Geröllabhängen der alpinen Region, 2000—2400 m (exs. Nr. 973).
- Crepis Reuteriana* Boiss. — Boiss., Fl. Or., III, p. 846. Libanon: Sannin, an Bachrändern in subalpiner Zone, 1500—1800 m (exs. Nr. 974).
- var. *alpina* Boiss. — Boiss., Fl. Or., III, p. 846. Libanon: Im Geröll des Sannin, bei 2200 m (exs. Nr. 972).