

minor Willk., à écailles externes du péricline pulvérulentes-tomentoses, les intérieures glabres.

Zollikoferia resedæfolia Coss. var. *minor*.

Diffère de la forme *genuina* et de la var. *viminea* Lge par ses tiges plus courtes, dressées, très rameuses dès la base, à rameaux grêles, intriqués, divariqués, formant une touffe compacte, et par ses fleurs plus petites que dans la forme *genuina*.

Sonchus zollikoferioides Rouy

Calathides en corymbe lâche et pauciflore portées par des pédoncules allongés, abondamment glanduleux. Folioles du péricline lancéolées-linéaires, pulvérulentes. Achaînes bruns pâles, oblongs-obovés, munis sur les faces de côtes fines, ridés-chagrinés, non bordés. Feuilles épaisses, glabres, la plupart ramassées à la base des tiges, plus ou moins glaucescentes, pétiolées, pinnatiséquées, à rachis étroit, linéaire, à segments tous étroitement linéaires, presque opposés par paires, entiers ou plus rarement pourvus à la base de 1-2 dents terminées ainsi que les segments par un mucron calleux (comme dans les feuilles de *Zollikoferia*), dirigés en arrière, allongés, ténus; feuilles caulinaires moyennes à pétiole légèrement dilaté à la base, amplexicaule, à oreillettes presque arrondies, non longuement acuminées. Tiges de 1-2 décim., dressées, grêles, arrondies, striées. Racine bisannuelle ou vivace. — Feuilles presque semblables à celles du *Zollikoferia pumila* DC. — Port du *Z. resedæfolia* Coss.

Cette espèce ne peut être rapprochée que du *S. tenerrimus* L. forme *pectinatus* DC., dont elle se sépare bien par les caractères soulignés dans la diagnose ci-dessus.

Andryala Rothia Pers.

Persoon caractérise ainsi cette plante pour la distinguer des *A. integrifolia* et *A. sinuata* L.: « *Caule basi ramoso diffuso, foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis amplexicaulibus.* » (Syn. II, pag. 379.)