

**ZOLLIKOFERIA ANGUSTIFOLIA** Coss. et DR. — *Sonchus angustifolius* Desf. l  
*Atl.* II, 225 in herb. Mus. Par. — *Rhabdotheca angustifolia* C. H.  
 Schultz in herb. Mus. Par.

*Planta annua* vel biennis, sæpius cæspitosa, radice longa fusiformi crassiuscula; caulibus pluribus, rarius subsolitariis, sæpius diffusis, fere a basi ramosis, ramis divergentibus, monocephalis, bracteatis, ante et post anthesim apice arcuato-nutantibus; foliis glaucescentibus, subcarnosis, glaberrimis; radicalibus rosulatis, pinnatipartitis, rachi lineari, laciniis linearibus dentatis vel subintegræ remotis inæqualibus apice albo-callosis; caulinis inferioribus basi late auriculata subamplexicaulibus, pinnatifidis, rachi lobis confluentibus lata sæpe dentata; superioribus sæpius indivisis; capitulis majusculis, ante et post anthesim nutantibus, ovato-subglobosis; involucri foliolis apice albo-callosis, adpressis, exterioribus subpatulis ovatis vel suborbiculato-apiculatis, interioribus oblongo-lanceolatis, omnibus post achæniorum delapsum reflexis; receptaculo nudo; achæniis brevibus, erostribus, tetragonis, angulis late membranaceo-alatis alis tenuibus fimbriatis, et inter angulos costulatis, costulis 8 subalato-membranaceis, alis fere ad basim in pilos fimbriatis; achæniis interioribus non nullis sterilibus, linearibus, tetragonis, ima basi cornubus 4 brevibus instructis; pappo sessili, multiseti, multiseriali, densissimo, molli, candidissimo.

In deserti Algeriensis glareosis, calcareis vel argilosis, præsertim in locis hyeme inundatis vel humidis: *Biskra* (Jamin pl. Alger. exsicc. n. 263 sub nomine *Z. pumila*; Balansa pl. Alger. exsicc. n. 1015, florifera et fructifera 12<sup>a</sup>-aprilis 1853, sub nomine *Sonchus Lybicus* Spach ined.); loco dicto *Dahia de Taiquetbine* prope *Guerrara* (Reboud, florifera et fructifera 23<sup>a</sup> novembris 1854.) — In deserto Tunetano prope *Cafsa* (Desf.) et prope *Gabès* (Kralik).

Cette espèce se distingue des autres *Zollikoferia* par la racine annuelle ou bisannuelle, et surtout par la forme remarquable des akènes; elle est le type d'un sous-genre, pour lequel nous proposons le nom de *Lophocarpus*; elle n'avait été placée dans le genre *Sonchus*, à côté du *S. arvensis*, par Desfontaines et De Candolle, qu'en raison de l'état imparfait des échantillons que ces auteurs avaient eus à leur disposition.

**ANTIRRHINUM RAMOSISSIMUM** Coss. et DR. ap. Jamin pl. Alger. exsicc. n. 254, et ap. Balansa pl. Alger. exsicc. n. 843.

*Planta suffruticosa, ramosissima, cæspitosa, habitu Scrophulariam ramosissimam referens, glabra, cortice in caulibus parte inferiore cinerascente rimosa, ramis numerosis sæpius divaricatis intertextis demum spinescentibus; foliis paucis, alternis, linearibus, integerrimis; floribus solitariis, pedicellatis, pedicellis bractea multo longioribus, in racemos virgatos elongatos laxos dispositis; calycis laciniis lanceolatis acutiusculis, glabris;*